

新刊醫林狀元壽世保元

新刊醫林狀元壽世保元庚集七卷

太醫院吏目金谿雲林龔廷賢子才編著

男

龔定國

校

龔安國

南雍太學生監印周文卿光霽堂鐫

婦人科

婦人之病有可治有不可治者皆由其心性善惡所關也。聞有德性柔良舉止端重者盡婦道。故翁姑相夫教子。凡內助理家女工。非曰桑麻之事。無不盡善者。必無疾病。雖或有之。亦易為治也。有等逆妬。發惡口。尊凌卑。惟其衣食自私。全無宗祀之念。犯有七去。助無一能。天數將入膏肓。雖盧扁亦難治療。予因痛識此病。借立醫方。以為勸戒。其真胎前產後等病。各自有方。開具于後。

婦人總論

夫婦人乃衆陰所集常與溫居榮衛和平諸疾無由而生榮衛虛弱則百病生焉經云二七而天癸至任脉通太衝脈盛月事以時上下交感則有子矣其天癸者天一生水也任脉通者陰用之道泰也太衝脉盛者血氣俱盛也何謂之月經月者陰也經者經絡也過期而行經者血寒也來期而先行者血熱也經行作痛者氣之滯也來後或作疼者氣之虛也其色紫者爲風黑者多熱淡者多痰如煙塵水者血不足余考古方耗其氣以調其經則以爲人之正氣不宜耗也太衝者氣也任脉者血也氣升則升氣降則降血隨氣行無暫息若獨耗其氣血無所施正氣既虛邪氣必勝故百病生焉其經安得調乎况心生血脾統之胃爲之元也養其心則血生實其脾則血足氣勝則血行矣安得獨耗其氣哉此調經之要法也行經之時保如產母一失其宜爲病不淺當戒暴

怒其損於衝任遠色然其損於血海一有抑鬱宿血必停走於腰脇注於腿膝遇新血擊搏則疼痛不已既於四肢則麻木不仁入於血室則寒熱不定或怔忡而煩悶或入室而狂言或湧上出或歸太陽皆四氣七情之所致也余考產後一科胎前血氣用藥溫暖於理最當治法至於子和論產後出血數斗世人皆以血氣兩虛妄用溫熱之劑養血補虛止作寒治舉世皆然故有誤者殊不知妊孕如天地之孕物陰陽和合人物俱生陰陽偏勝豈得孕乎譬如瓜果值冰旱花實落故立秋後十八日寸草不結乃寒不發生也今婦人終於十月而產者反爲寒治則非理矣若子和之法當行溫涼溫熱之劑實所禁也以余常用和暖之劑使血得暖以流通其惡露自盡故無後患耳況生產有難易血氣有盛衰豈可偏執一法能盡產後無窮之變焉余每經歷新產月裏用溫暖治効者十多八九用溫涼治効者百無十三豈若子和之法施於月外惡露自其陰虛潮熱往來當行溫涼之劑故無禁耳其月裏可

不慎哉人子受胎雖係陽精所注實賴母血而成亦若瓜果賴枝葉所
蔭也今婦人終於十月而產者卽瓜熟蒂落自然之意雖胃氣易傷食
調理不宜急迫則隨手而愈間有失珍重不滿十月而動胎產者猶若
枝蔓瓜果有所傷也胞係腐爛胎始墮落故此得病則難愈矣昔人所
謂小產傷如大產者此也凡婦人新產榮衛俱虛腠理不密或冒風寒
或傷飲食或惡露不通或血行過度如此四者俱能移寒熱於胞腹痛
又不可相類而用藥也又如產後脾胃既虛或多食鷄子冷物所傷脾
胃遂成傷食以致身熱氣口脉盛當行消食之藥世人多因身熱便爲
外感然行溫涼之藥發汗退熱胃氣轉傷豈無死者產後半月之前雖
去內外之邪亦當兼行血氣如過半月已後若有雜症不可專執產後
一門治療又當各類中求之庶無訛誤病體矣

調經諸方

○一論此方調益榮衛滋養氣血治衝任虛損月水不調脰腹痞痛崩中

漏下血瘕塊硬發歇疼痛姙娠宿冷將理失宜胎動不安血下不止及產後乘虛風寒內搏惡露不下結生瘕聚小腹堅痛時作寒熱婦病頭四物湯

當歸身酒洗川芎

白芍藥酒炒懷熟地黃各二錢

右剉丁剉水煎溫服者病加減

一經候將來腹中陣陣作痛作止者血氣實也用生地加黃連香附桃仁紅花玄胡索牡丹皮莪朮

一經水常不及期而行者血熱也用生地加黃連黃芩白芍

一經水常過期而來者瘦人多是血少倍當歸地黃加黃芪甘草少佐以紅花桃仁泥以爲生血之引用也肥人太槩是氣虛挾痰阻滯升降然也去地黃加參芪甘草茯苓半夏陳皮香附

一常過期而紫黑成塊者血熱也多作腹痛用生地加香附黃連玄胡索五靈脂乳香沒藥

一經期而血淡色者。痰多血少也。用生地黄合二陳湯煎服。

一肥盛婦人經水或三二個月一行者。痰盛而軀脂閉塞經脉。以致痰滯。加芎歸香附蒼朮白朮。

一經水適來適斷。往來寒熱如瘧者。合小柴胡湯煎服。

一經行過三五日。腹中綿綿走痛者。此血行而滯氣未盡行也。加木香檀榔煎服。

一經水行後而作疼者。氣血俱虛也。加四君子湯煎服。

一經事欲行。臍腹絞痛。臨經者。血澁也。加川練子小茴木香檀榔玄胡索。行經時。忍著氣。悶後得心腹腰脇痛。不可忍。脉弦急。不勻。乃瘀血作痛也。加桃仁紅花玄胡莪朮青皮。行血即愈。

一經行不正。加炒阿膠地榆荆芥穗。

一婦人因經血過多。得五心煩熱。日晡潮熱。加胡黃連。二三服効。

一婦人筋骨肢節痛。及遍身頭疼。兩手脈弦。增寒如瘧。每以散風止痛之。

一 刺因効。加羌活防風秦艽官桂立効。

一 血崩初起不問虛實加荆芥穗燈上燒過防風升麻如不止加蒲黃炒

白朮炒升麻

一 治血崩加荆芥黃芩香附

一 治崩漏加沙參益母草香附炒阿膠炒

蒲黃炒

陳皮

白水

甘草 去當歸不用

一 赤白帶下加柴胡升麻酒炒各半夏薑汁炒白茯苓 蒼朮酒浸炒

黃柏酒炒知母酒炒乾薑炮升陽除濕帶自除也。

一 胎動下血不安加艾葉阿膠炒黃芩 白朮 砂仁 香附 糯米

一 胎死腹中加官桂白芷麝香 一 產後惡露不行加益母草桃仁蘇木

一 產後血虛昏暈不醒加入參白朮白茯苓乾姜香附甘草

一 腹中氣塊加木香檳榔

一 血積塊痛加三棱莪朮官桂乾漆炒

一 口乾煩渴加麥門乾葛烏梅

一 骨蒸勞熱加知母地骨皮柴胡

小便閉澀加澤瀉木通

一太便不通加桃仁大黃

虛煩不眠加竹葉人參酸棗仁炒

心神恍惚加遠志酸棗仁白茯苓辰砂另研

嘔加藿香半夏砂仁陳皮

一瀉加白茯苓白木蓮肉山藥炮乾姜

婦人經水先期而至血紫有塊腰痛手足冷痺口乾頭眩胸痞本方加

條芩荆芥香附小茴玄胡續斷杜仲地榆甘草

婦人血塊作痛不可忍者加三棱莪朮青皮陳皮小茴香附吳茱萸玄

胡索木香甘草姜棗煎服

婦人經不下行逆經吐血不止本方一兩加川大黃酒浸炒一兩水煎

入童便同服立効

婦人女子經信愆期以致鼻衄錯經妄行本方去地黃加桃仁山梔炒

大黃酒炒甘草共七味水煎服入童便同服

婦人經行三日後來多不止本方加伏龍肝地榆蒲黃黃柏側柏葉黃

連白茯苓甘草梔子十三味。○以氣極加香附。○脾胃虛寒食加白朮。
一論婦人經不調或腹痛白帶或淋瀝不止或肌瘦者頭目眩暈面色
痿黃四肢無力以十全大補湯加香附陳皮玄胡砂仁阿膠沉香小荷
香吳茱萸。

○一論室女十四歲經脉初動名曰天癸水至失於調理心腹脹滿惡寒
發熱頭身通疼此感寒血氣不順宜服小溫經湯和氣散主之。

小溫經湯

桂枝	三分	白芷	四分	羌活	四分	柴胡	四分	白朮	五分
砂仁	四分	當歸	酒洗一錢	香附	炒一錢	川芎	七分	黃芩	七分
熟地黃	一錢	甘草	二分	枳殼	去穢七分	小茴	酒炒四分	白芍	酒炒一錢
刺心腹	難忍	加玄胡	乾漆炒各五分	咳嗽	加杏仁	去穢	失	五味子	
附桔梗	射右側	丁劑生姜	三片	水煎	熱服				

和氣散

香附炒五錢黃芩四錢

枳殼去穢炒

陳皮

藿香

小茴酒炒

白朮去蘆

玄胡索

砂仁

草果去殼

甘草八分

厚朴去皮五錢

右為細末每服二錢空心米湯調下酒亦可

○一論室女十五六歲經脉不通日夜寒熱手足麻痺飲食少進頭眩惡心嘔吐腹中忽然結塊痛者此症誤食生冷所傷可服

加減四物湯

香附炒一錢當歸酒洗

川芎

枳殼去穢

柴胡

白芍酒炒各黃芩

陳皮

三稜醋炒

莪朮醋炒各

熟地黃一錢白芷

玄胡索

小茴酒炒

白朮去蘆炒

青皮去穢

砂仁

肉桂

甘草各五分

右剉作一劑水煎空心熱服遍身痛加羌活

○一論室女十七八歲經脉不通或百日或半年顏色青黃飲食少進寒

熱往來四肢困倦頭暈目眩肚痛結塊五心煩熱嘔吐膨脹此乃脾胃
受傷血氣俱弱快食生苓急宜和氣血扶脾胃先以逍遙散次服加味
八物湯後服調經丸

逍遙散
當歸酒洗二分 白芍酒炒 柴胡二錢 黃芩一錢 川芎七分
熟地黃七分 半夏炒七分 人參五分 麥門冬五分 甘草四分
右剉散生薑三片水煎熟服後服八物湯十劑又可服調經丸
若少睡加酸棗仁炒以欬心血
加味八物湯

香附

當歸

白芍酒炒

白朮去蘆

川芎

人參

熟地黃

小茴香炒

黃芩

柴胡

白茯苓去皮甘草炙腹痛加玄胡索枳殼乾漆○嘔吐泄瀉加良姜
砂仁○手足麻痺腰膝加肉桂○咳嗽加杏仁五味子款冬花

壽世保元

庚集七卷

六

右劉永煎膠

調經丸

香附

醋浸三兩

當歸酒洗

白朮

去蘆兩半如腹

枳殼

麩炒

赤芍

陳艾醋炒

陳皮

小茴酒炒

川芎

厚朴

姜汁炒熟地黃

酒蒸各一兩半

青皮

去蘆二錢

玄胡索

砂仁

三錢醋浸煨

糯米醋浸煨牛膝

酒洗

白芷

粉草各一兩

右為細末醋打米糊為丸如梧子大每百丸空心米湯送下

○一論婦人二十歲後起經脉動來沿身疼痛手足麻痺寒熱頭暈可服

加減五積散

厚朴

法去皮姜

蒼朮

米泔浸川芎

白茯苓

去皮

當歸酒洗

半夏

麩炒

白芍

酒炒

獨活

羌活

牛膝

去蘆

桔梗

白芷

枳殼

麩炒

麻黃

去根

陳皮各等分

甘草三分

右制散，薑蔥煎熱服。○咳加五味杏仁。○濕去，枳殼加肉冠。

○一論婦人二十三四歲經水不調，或赤白帶下，或如梅汁淋漓，或成片有塊，至三月者，此乃氣血虛弱，漸生潮熱咳嗽，飲食少進，四肢倦怠，日久變生骨蒸，即成勞瘵。急當調治，可服前加味八物湯，因劑溫經湯，大溫經湯。

香附 八分

當歸 酒洗 八分

白芍 酒炒 七

熟地黃

人參

白茯苓

去皮

白朮

去蘆

吳茱萸 炒

玄胡索

川芎 各五分

砂仁

陳皮

小茴 酒炒 各

沉香 三分

黃連 鹽炒

阿膠 炒

肉桂

甘草 各三分

右制一劑生薑三片，水煎，空心熱服，如汗不止，加酸棗仁，炒黃芪蜜炒，咳嗽加杏仁五味半，夏枯草各五分，潮熱加柴胡黃芩。○一論婦人二十四歲所服藥，加味四物六君湯。

加味四物六君湯

厚朴姜汁

半夏姜汁

當歸酒洗

香附絡五

枳實姜炒

白茯苓去皮川芎

赤芍

蘇葉

檳榔

桔梗

白朮去蘆各砂仁

紅花

黃連酒炒各

全胡三分

陳皮四分

甘草二分

右判散生薑三片水煎空心熱服

○一論婦人二十五六歲血海虛冷經水不調或時小腹疼痛或赤白帶如魚腦或似米泔不分信期每自淋瀝不止面色痿黃四肢無力頭暈眼花目眩怔服四物補經湯兼服烏雞丸調理

四物補經湯

香附

當歸

白芍

酒炒各熟地黃

川芎各五分

黃芪蜜炒

白茯苓去皮

白朮

去蘆

黃芩

玄胡索

陳皮各四分砂仁

小茴酒炒

人參

阿膠炒

沉香另研 吳茱萸銘二粉草二分

右劉生薑三片水煎空心熱服

烏雞丸

海金沙

側柏葉鹽水浸焙乾

香附砂三

厚朴姜炒三

當歸酒洗三兩

白朮去蘆

川芎各二兩

白芍酒炒二兩

熟地黄二兩

羌活

一兩半

防風各一兩

人參一兩

砂仁

各一兩

粉草三錢

右劉用白毛烏肉膳雞一隻不問三五老者俱好殺淨去腸屎毛將藥

一半入雞肚中放銅鍋內好酒五盞水二瓶文武火煮至乾雞爛去骨

取肉切細同藥晒乾篩末用藥茶粉酒水煮稠為丸如梧子大每服

九空心米湯吞下酒亦可

○一論婦人二十七八歲身體虛敗經水不時淋漓或盛后或下黑水或

色青黃虛暈眼花四肢困倦服此四五劑後服前大溫經湯一劑

正經湯

常歸 鐵酒洗三分 白木 去皮 八白芍 酒炒 川芎 熟地黃

香附 阿膠 炒 黃芩 蒲黃 炒 側柏葉

砂仁 各七 甘草 炒

右劉生薑請等心熱服○咳加五味子杏仁去皮○肚痛加枳殼玄胡

索乾漆○氣急加半夏蘇子各五分

一治婦人經水來多不止月斷艾下兩好生酒炒三次礞石入水煎

滾去清濕服立止

一治婦人三十工正歲年年生育敗血過多以致經水不調不時腹中

疼痛結塊飲食少進困倦目眩潮熱往來五心煩燥此血虛胃熱宜服

紅花當歸散

當歸 酒洗 八川芎 赤芍藥 熟地黃 黃芩

香附 各六分 枳殼 五分 玄胡索 五分 厚朴 姜炒 小茴香 酒炒

柴胡

陳皮

三稜醋煨

莪朮醋煨

牛膝酒洗各

紅花三分

甘草二分

右列生薑水煎空心熱服

○一論婦人三十四五歲因經水來時鬱氣坐臥失於迴避，肢體虛冷，針引不入，遍身麻痺，不能轉側，肺經受感，咳嗽痰盛，宜服五積交加散，以痛又服八物湯十餘劑，五積交加散只可服一二劑，勿多服。

羌活一錢

當歸酒洗

川芎

獨活

白芷

厚朴姜炒

蒼朮

米泔炒防風去蘆

枳殼姜炒

陳皮

半夏姜炒

麻黃

桔梗

白茯苓

柴胡各八分

桂皮四分

甘草三分

右列薑葱煎熱服再服去柴胡加烏藥、續命各一錢，酒煎熱服。
○一論婦人三十六七歲經行太過，血氣虛耗，胃氣不足，故經水來而可

進八珍湯同烏雞丸治之

八珍湯

當歸酒洗

白朮

去蘖各一錢

白茯苓

去皮入參

川芎

熟地黃

白芍

酒洗各八分

甘草三分

加香附八分

右剉生薑水煎熱服

○一論婦人三十六歲經脈不行腹中有塊疼頭暈眼花不思飲食身
中斷以餘血未盡不時攻痛成疾宜我朮散逐去餘血

我朮散

香附三兩

當歸酒洗

我朮酒洗

玄胡索

赤芍藥

枳殼麩炒

熟地黃

青皮大粒

白朮上屑

黃芩各一兩

三棱酒洗

小茴香炒

砂仁

各八錢

乾漆炒盡烟

紅花各五錢

川芎八錢

甘草一錢

右為細末每服二錢空心好米酒調服

○一治婦人腹中常當作痛上下不定經年積血也

青皮

陳皮

三稜

莪朮

香附

烏藥

乾姜

右各等分醋煮乾為末入心陳皮湯調下

○一治婦人四十二歲經水斷絕五十二復來或淋漓或成疔或痛下不止宜服和經湯兼四物補經湯烏雞丸相間服之可好和經湯在帖即去熟藥乃香附陳皮小茴是也

和經湯

白芍

酒炒一分當歸

酒洗熟地黃

白茯苓

黃芩

香附

白朮

去蘆

川芎

酸棗仁

炒蒲黃

阿膠

炙少各

白芷

一錢

陳皮

小茴

酒炒各

甘草

右剉每服一兩薑棗煎熱服四物補經湯烏雞丸方俱見前

○一凡婦人經水不調或前或後或多或少時常頭暈眼黑耳鳴赤白帶

下。腰腹疼痛，五心煩熱，四肢沉困，胸膈痞悶，不思飲食，肌膚減削，一切百病皆治，宜此。

調經滋補丸

香附米

酒醋童便各湯各浸一兩

當歸

酒洗二兩

川芎

白芍

酒炒各一兩 懷生地黃 酒浸砂鍋蒸

白朮

去蘆炒二兩

白茯苓

去皮一兩

陳皮

一兩 懷山藥 一兩 山茱萸 酒蒸去核

牡丹皮

一兩

小茴

酒炒 玄胡索 一兩 阿膠 蛤粉炒一兩

右為細末，酒醋打麪糊為丸，如梧子大，每服百丸，空心米湯送下。

○一論婦人五十歲以外，經水猶不斷，顛顛倒倒，不准而來，當預防恐成

敗血症也，此丸甚妙。

千金丹

當歸頭 二兩 懷山藥 三兩 白朮 二兩

人參 二兩

黃芩 酒炒二兩

白茯苓 去心皮一兩

懷生地黃 酒拌烘乾四兩 綿地榆 二兩

鹿角霜二兩黃柏酒炒黑二兩

右共爲細末，用艾葉三兩水二觔，煎至一觔，去渣入淨小麥粉六兩，攪勻，煮熟糊和藥爲丸，每日空心二百五十丸，補柏葉煎湯送下。

○一治婦人因怒吐痰，胸膈作痛，服四物二陳，不連枳殼之類，不應更加祛風之劑，半身不遂，筋脈攣攣，四肢痿軟，日晡益甚，內熱口乾，形體倦怠，急予以爲辭，恐傷脾胃，氣血復損，而然遂用逍遙散，補中益氣湯六味丸調治，喜其謹疾，年餘悉愈，形體康健。

○一治婦人肺熱，肢體痠倦，飲食少無味，月經不行，或鼻衄，或血崩，久矣。或用順氣清熱等劑，不應更加寒熱，且時欲作嘔，此乃肝怒，傷損脾胃，虛火錯經妄行，而然耳以補中益氣湯，兼六味丸。

○一治婦人多怒，經行旬餘不止，後淋瀝無期，肌體倦瘦，口乾內熱，盜汗如洗，日晡熱甚，皆由肝脾虧損，無以生發元氣，以補中益氣湯，加茯神遠志麥門冬酸棗仁五味牡丹皮龍眼肉。

逍遙散方見後庫
補中益氣湯方見內傷
六味丸方見補益
十全大補湯方見補益

斷產方論

婦人欲斷產者不易之事。雖曰天地太德日生。然亦有臨產艱難或生而不可已。或不正之屬。爲尼爲娼。不欲受孕而欲斷之者。故錄驗方以備所用。然其方頗衆。且多有用水銀。虫水。蛭之類。孕不復懷。難免受病。此方平和而有異驗。具于後。

一婦人斷產驗方

故蚕紙方圓一尺。燒爲末。酒調服。終身不復懷孕也。

一千金斷產方

油煎水銀。丁日方息。空心服如棗大一圓。永斷不孕。且不損人。

一斷子法

用白麵麴一升。無灰三斗。打作糊。煮至一升半。絹袋濾去渣。分作三服。

候月經來日晚吃一服五更吃一服天明吃一服經事即行終身無子

經閉

脈女人尺脈沉而右手脈大皆其常也若腎脈微瀉或浮或沉而斷絕
不勻或肝脈沉而急皆經閉不調之候也

丹溪曰經候有枯閉不通者有不及期與通期者有妄行者有血色紫黑及
淡者有或塊者有作痰者夫經不通或因墮胎及多產傷血或因勞心
潮熱銷血或因久發盜汗耗血或因脾胃不和飲食少進而不生血或
因痢疾失血治宜生血補血除熱調胃之劑隨症用之或因七情傷心
心氣停結故血閉而不行宜調心氣通心經使血生而經自行矣

一治婦女經閉不論虛實寒熱新久即服此方有殊効

清熱通經湯

當歸一錢

川芎八分

白芍酒炒一錢

生地黃一錢

大黃七分

官桂四分

厚朴煨炒

枳殼一錢

枳實一錢

黃芩一錢

蘇木一錢

紅花五分

桃仁去尖 烏梅一個

右劉生姜三片水煎空心溫服不數劑而奏效

○一論婦女經水不通腹中積塊癥瘕瘕攻注別癰氣服

歸木破癥湯

歸尾酒洗

赤芍

白芍

青皮

三稜醋炒

莪朮醋炒各一錢

香附醋炒一錢

烏藥七分

官桂

蘇木

紅花各五分

右劉一劑水煎入酒下盡空心服

○一論婦女經閉二三年不通脛三下下塊如碗口大間或吐血或便血

發熱咳嗽吐痰衄汗等症宜

養血調經丸

當歸酒洗

川芎

兩

白芍酒炒

熟地黃

四兩

山茱萸

酒洗去

白茯苓二兩 懷山藥二兩 牡丹皮一兩 澤瀉半兩 梔子仁半兩

益母草二兩 生地黄二兩 香附米二兩 陳皮半兩

右為末煉蜜為丸如梧子大每服三錢空心淡薑湯送下

○一治婦人血瘀作痛臍下脹滿或月經不行發熱體倦

當歸八分 桂心六分 玄胡索四分 白芍六分 血竭六分

蒲黃炒六分

右為末每服二錢空心酒調下

消積通經丸

香附米二兩 艾葉二兩 當歸二兩 川芎一兩 赤芍二兩

生地黄二兩 桃仁一兩 紅花二兩 三稜一兩 莪朮一兩

乾漆炒一兩

右為細末醋糊為丸如梧子大每服八十九臨卧淡醋湯送下

○一治婦女月經不通鼻衄出血不止 付邱張王陽傳

當歸半一錢

川芎一錢

白芍半一錢

生地黄

清少知母一錢

黃柏

蒸木炒桃仁

去皮尖一錢

牡丹皮

一錢

大黃

用紅花蘇木黃根煎酒煮大黃

茅根

側柏葉各二錢

右剉一劑水煎空心服

○一治室女經水不行翰林張明字傳

當歸

川芎

赤芍

生地黄

荆芥穗

枳殼

麩炒各一錢

馬鞭草

牡丹皮

杜牛膝

生蒲黃各五分

桂心二分

烏梅半個

右剉一劑水煎服日二劑過期不行加澤蘭葉

○一治室女經閉咳嗽熱屬虛弱者宜

養益通經湯

牡丹皮

當歸各一錢

白芍

生地黄

陳皮

白朮去蘆

香附各一錢

柴胡

黃芩各七分

甘草四分

右出一劑水煎空心溫服。

通經調氣湯 治症同前

當歸酒洗

川芎

白芍酒炒

生地黄

香附米

童便炒

牡丹皮

八錢

柴胡六錢

黃柏

酒炒大

知母

童便炒

牛膝

酒洗

八錢

桃仁

去皮尖

紅花

二味量加

右剉十劑水煎空心一服食遠下服。

○一治婦人經閉不通不論新久下取良法。

下取通經丸

乳香

沒藥

孩兒茶

巴豆

去殼

血竭

葱白

各五分

班貓五個

右為末共搗為丸組裝三層繫於筒口上將繩繫住送入陰戶內三四

寸許俟一炷香經水即下

○一治婦人胃氣素弱，經水三月不行，此乃悲傷肺，以補中益氣湯加桔梗，貝母兼進六味丸。

○一婦人經閉八月，肚腹漸大，面色或青或黃，用胎前之藥不應，余診視之，曰：面青脉沉，寒熱往來，肝經血病也。此驚怒傷脾，肝之症，非胎也。不信，仍用治胎散，不應。余用加味歸脾逍遙之藥，各二十餘劑，諸症漸愈。彼欲速效，別服通經丸，藥下腹下血，皆憤自汗，惡寒手足俱冷，嘔吐不食。余用人參炮姜二劑，漸愈。又用十全大補湯五十劑而安。

○一婦人久患癰，形體怯弱，內熱，補熱自汗盜汗，飲食少，思月事不行，或用通經丸，虛症悉具。此因虛而致癰，因癰以閉經也。用補中益氣湯及六味地黃丸，癰愈經行。

○一婦人性沉多慮，月經不行，胸膈食少，或作脹，或吞酸，予以爲中氣虛寒，用補中益氣加砂仁香附煨姜二劑，而胸膈和飲食進，更以大君加芎歸貝母桔梗生姜大棗數劑，服以健而經自調矣。

○一婦人患胃火或服用辛甘以治後因勞發燥渴內熱肌肉消瘦
經不行此胃火消燦陰血用逍遙散加牡丹皮炒施子以清胃熱用八
珍湯加茯苓遠志以養脾血而經自行矣。

補中益氣湯方見內傷六味丸方見補益十全大補湯方見補益逍遙散
方見婦人虛勞歸脾湯方見婦人虛勞六君子湯 八珍湯 俱見補益

崩漏

婦人漏血下赤白且下血數升脉急疾者死遲者生○又曰尿小虛滑
者生太緊實數者死○又云尺寸脉虛者漏血帶血脉浮不可治此
夫婦人崩中漏下者由勞傷血氣衝任之脉虛損故也衝脉任脉皆經脉
之海皆起於胞內而手太陽小腸之經也手少陰心之經也此二經上
為乳汁下為月水婦人經脉調適則月水依時若勞傷衝任氣虛不能
制其經脉血非時而下淋漓而不止謂之漏下也致五臟傷損者服之

色隨臟不同。若五臟皆虛損者，則其色隱血下。診其脈寸口弦而大弦，則爲藏大，則爲邪藏，則爲寒。邪則爲虛，虛寒相搏，其脈爲牢。婦人卽孕產而漏下，又云尺脈急而弦，大風邪入少陰之經，女子漏自下，赤又漏下，赤白不止，脈小虛滑者生，脈太緊實數者死也。又漏血下，赤白日久，血數斗，脈急疾者死，遲者生也。又云，尺寸脈虛者，漏血，漏血脈浮不可治也。若經候過多，其色紫黑甚者，崩下，吸吸少氣，臍腹疼痛，則汗出如雨，尺脈微小，由衝任虛寒爲風，客乘胸中氣不能固，可灸關元百壯，在臍下宮中三寸。

○一論女子漏下，惡血月事不調，或暴崩不止，多下冰漿之物，皆因飲食不節，勞倦所傷，或素有心氣不足，致令心火乘脾，必怠惰嗜卧，困倦乏力，氣短氣急，脾主滋榮周身者也，脾胃虛而心胞乘之，故漏下月水不調也。况脾胃爲血氣陰陽之根蒂也，當除濕去熱，抑風氣上伸，以勝其濕。又云，火鬱則發之，宜用。

升陽降濁湯

當歸酒洗五錢 黃芪一錢半 蒼朮一錢半 柴胡一錢半 升麻一錢

藥本一錢 防風一錢 羌活一錢半 獨活五分 蔓荊子七分

甘草多一錢

右剉作一劑水煎空心溫服少時以酒飲壓之可平服而愈又灸足太陰脾經血海穴二十七壯此藥乃從權之法因風勝濕為胃氣下陷而氣迫於下以收其血之暴崩也往後必須服黃芪人參當歸炙甘草之類數服以補之

一治婦人崩漏多因氣所使而下者

黃芪蜜炒五錢 人參五分 白朮去蘆一錢 當歸身酒洗一錢 川芎五分

白芍酒炒一錢 熟地黃一錢 香附一錢 蒲黃炒五分 地榆五分

升麻三分

右剉一劑水煎空心服

○一治婦人經水過多不止者

樗根皮七錢半 白芍炒一兩 黃芩炒一兩 龜板炙一兩 黃柏炒三錢

香附子童便浸一宿二錢半

右為末酒糊為丸如梧子大每服五十丸空心溫酒白湯任下

○一治婦人血崩氣血兩虛而兼熱者

當歸酒洗一錢 川芎七分 人參一錢 黃芪蒸炒一錢 防風八分

荆芥一錢 白芍酒炒八分 真阿膠炒成塊二錢 艾葉醋炒一錢 蒲黃炒

黃連酒炒一錢半 黃芩酒炒一錢 白朮去蘆土炒一錢 生地黃姜汁炒一錢半

地榆一錢 山梔子炒黑一錢 甘草生三分

右剉一劑水煎空心溫服或臨睡煎服

○一治婦人血崩或作肚腹刺痛者

蒲黃炒 五靈脂 官桂 雄黃 甘草各一錢

右為細末每服一錢姜湯調下

一治血崩漏下多心神恍惚虛損者其

復元養榮湯

遠志肉五分人參一錢半酸棗仁炒一錢黃芪蜜炒一錢荆芥八分

白芍蜜炒一錢當歸頭一錢地榆一錢白朮蜜炒一錢甘草三分

右剉棗一枚水煎溫服○如虛極發狂不省人事口噤者以醋磨其血

又將鐵鎚燒通紅浸入醋碗內沸起醋氣盡去其毒過此產後消法也

○一治婦人經候凝結黑血成塊左廂有血瘕水泄不止食有時不化後

血塊暴下并水泄俱作是前後二陰有形血脫竭于下既久經候猶不

調水泄日三四行食罷煩心飲食減少人形瘦弱血脫者氣虛聖人之

法也先補胃氣以助生發之氣故曰陽生陰長諸甘藥為之先粉也其

能生血陽生陰長之理人身以穀氣為寶其以先理胃氣為要

益胃升陽湯

黃芪蜜炒一錢人參一分錢二甘草炙一錢陳皮一錢白朮蜜炒一錢去蘆二錢

當歸一錢

柴胡五分

升麻五分

神曲

炒一錢

生黃芩二分

右剉一劑水煎服。○腹痛加白芍三分中桂少許。○如口乾作渴加葛

根五分

○一異人傳授秘方治血崩如神

金鳳膏

白毛烏肉雄雞一隻吊死水泡去毛去腸雜不用將金櫻子之根洗淨切片裝入肚內酒煮令熟去藥將雞酒任意食之

○一治血崩試効方

雲萊翁傳

懷生地黃

用砂仁陳皮煎水蒸黑大分

牡丹皮

六分

石棗

酒蒸去核六分

懷山藥

五分

條苓

酒炒八分

蒲黃

六分

炒阿膠

炒八分

香附

醋炒六分

白芍

酒炒八分

白朮

去蘆炒六分

黃連

姜汁炒八分

陳皮

五分

甘草

一分

右合一劑生薑三片棗一枚不拘時服

○一治婦人五十以上經脉暴行內經曰火主速不可以冷病治之如丁

峻藥即死，此可謂黃連鮮毒湯，以清其上，加棕灰蓮殼灰以添其下，然
後用四物湯服，血和經可也。

一方治血崩，用槐花二兩，百草霜半兩，爲末，每服二錢，燒紅，研鍾乳，酒下。

一方治風熱血崩，荆芥穗燈火燒焦，爲末，每服三錢，酒下。

一方治血虛內熱，血不歸元而崩，桂心燒存性，爲末，每服二錢，米飲調下。

一方治血崩，棕灰一撮，好酒調空心下服，立止。

一方治血崩，用益智仁爲末，每服二錢，以燒紅，研鍾乳，酒調服。

一方治血崩，用猪肉四兩，百草霜二兩，酒過，鹽水調服。

一方用乾鹽麩爲粗末，入罐內燒，冷，用婦坐其上，煙薰久久自止。

一方用鹿脂草，坐一劑，水煎服，立止。

一方雞子一個，去黃，入銀朱三錢，攪勻，燒存性，溫酒下。

一方鶴沙揀淨，爲末，每服三錢，空心溫酒調服。

一方五靈脂炒盡，麝香末每服一錢，溫酒調下。一方半生半炒。

一方香附米炒黑，爲末，每服三錢，空心熱酒調服，米飲亦可。

一婦人崩漏，面色黃或赤，時覺腰間瀉下，痛四肢困倦，煩熱不安，其經行先發寒熱，兩脇如束。此脾胃虧損，元氣下陷，與相火濕熱下迫所致，以益氣湯加防風、白芍、黃柏炒，煎服，歸脾湯而愈。

一女子漏下惡血，月經不調，或暴崩不止，多下水漿之物，或白帶流漏不止，皆因飲食不節，勞倦所傷，敗素有氣，不足致令心火乘脾，心火情嗜，困倦乏力，氣短氣急，脾去滋榮，過身者也。脾胃虛而心脾乘之，故漏下月水不調也。況脾胃爲血氣陰陽之根蒂也，當陰濕去熱，抑風氣上伸，以勝其濕，又云火鬱則發之，以益氣湯去參、木、陳皮，加蒼朮、茯苓，防風、羌活、蔓荊子。

一婦人經行太過，血氣虛耗，胃氣不足，故經水妄來，可以千金大補湯去桂枝，加香附。

一婦人患崩過服寒涼之劑其症益甚更加肚腹痞悶飲食不入發熱燥脈洪大而虛此脾經氣血虛而發燥也急用八珍湯加炮薑以溫補之緩則不救不信乃服止血降火之劑虛症蜂起始信予言緩不救矣

帶下

脉婦人帶下木極之病脉浮則為腸鳴腹滿緊則為腹中痛數則為陰中疼痛則生瘡弦則陰戶墮痛帶下脉浮惡寒漏下者不治

婦女下白而不甚稠者曰白帶與男子白濁同也係出於相火如龍雷之擾而不澄清然耳屬於足少陰太陽治當清補為主其下赤白帶者謂之帶下屬於心胞手厥陰少陽即若男子自遺之精甚即如破石之淋原乎心胞係於脊絡于帶脉通於任脈下注湧泉上至泥丸三三和云崩中日久為白帶漏下多特腎木枯乾之切矣治宜血肉之劑以和之此乃窮源探本之論百世不易之法時人皆如常套作湯藥以治

及以壯陽龍骨地榆落之類，是以四物藥以升提，不為虛本損傷，以致腐敗而來，彼滯滯不消之物，則益加其滯，升提不正之氣，則增遂其鬱，或非醫者之過，抑求治者之不賢也。凡遇是病，必以六龍內固九十六味保元湯主之。

十六味保元湯

黃芪一錢

人參二錢

山藥一錢

白茯苓一錢

當歸身一錢

巴戟肉二錢 石斛七分

川獨活一錢 升麻七分

黃柏酒炒八分

杜仲

小苗鹽煎湯拌炒一錢半

貫仲

去根土三錢

蓮蕊一錢

圓眼肉三枚

骨碎補

布先以稻草火上焙去毛粗布提淨一錢

生甘草三分

右剉一劑，水煎，空心溫服。潮熱加柴胡八分，黃芩酒炒一錢。帶甚

者，月經必少，其有聚而反多者，或紫適來，適漸瀰瀰落落而不淨者，加

荆芥一錢，黃連酒炒七分，地榆八分。若五心煩熱而口舌乾者，加知

母一錢，麥門冬一錢，地骨皮。大便澁而燥者，乃血少火燥，陽明也。四

婦人加參仁大黃等分研如泥半夜熱服之帶下久不能止服此藥亦
能奏效者宜六龍固本丸大効

○一論此藥能生血固真補心益腎帶不漏則經水自調月經調則有
孕男婦元氣充足產子少病而且壽矣此方不特赤白帶下有効凡小
產後虛者血山崩虛者五勞七傷女勞怯者一切不足之症并欲求嗣
得孕婦女諸虛皆有殊効者也

六龍固本丸

懷山藥 四兩 巴戟肉 四兩 山茱萸肉 四兩 川楝子肉 仁黃芪 二兩

小茴香

一兩 益二錢 補腎

補腎脂

二兩 黃柏 五錢 補腎脂 二兩 黃柏 五錢

人參 二兩

蓮肉 二兩

木瓜 一兩

用水三碗煎至一鐘排上三味

同微炒乾為度

當歸身 二兩 生地黃 二兩 白芍 一兩 川芎 一兩

四味用童便二鍾好酒一鍾拌蒸下日烘又湯又烘乾

右為末用班龍膠一料和丸如梧子大每服百丸空心淡鹽湯下

○一治婦人經水不調臍腹冷痛赤白帶下子宮虛冷久無子息先宜服五積散加香附吳茱萸小茴入米糖一塊煎服減麻黃後服此丸藥

白鳳丹

嫩黃芪蜜水炒人參去蘆白朮去蘆微炒白茯苓去皮黃歸身酒洗

川芎酒炒肉桂大附子剉碎鹽去皮脂

川乾姜炒胡椒小茴香酒炒破故紙酒炒艾葉醋炒

烏藥已上各二兩吳茱萸炒甘草各一兩香附米醋炒六兩

蒼朮米泔浸炒四兩

右剉片用白毛烏肉雞一隻重二斤弔死水泡去毛屎并頭足不用放鍋內將藥片蓋上入好酒煮爛為度取去骨同藥在鍋焙乾為末將雞酒汁打稀米糊為丸如梧子大每服五十丸空心好酒送下

一治婦人赤白帶下宜

補中益氣湯加黃柏知母香附半夏川椒薛川練子肉薑煎先服此湯

次進後九藥

歸附地黃丸

當歸酒洗

川芎一兩

白芍酒炒

熟地黃酒蒸

香附子

黃柏

黃柏

知母

知母

陳皮

陳皮

陳皮

陳皮

五味子

蒼朮

蒼朮

知母

知母

知母

知母

知母

知母

知母

方有

白朮

白朮

白朮

白朮

白朮

白朮

白朮

白朮

白朮

右為細末酒糊為丸如梧子大每服五十丸空心淡鹽湯下後用乾物

壓之忌葱白蘿蔔胡椒煎炒發熱之物

一治婦人赤白帶下用

迴源丹

當歸酒洗

熟地黃

熟地黃

熟地黃

熟地黃

熟地黃

熟地黃

熟地黃

熟地黃

人參各一兩

白芍酒炒

阿膠蛤粉炒

白朮去蘆

茅朮米泔製

椿根皮酒炒

黃柏酒炒各一兩

白茯苓去皮

白石脂火煨六錢

右為細末，米醋糊為丸，如梧子大，每服五六十丸，空心米湯送下。

○一治婦人赤白帶下，上熱下寒，口出惡氣，或咽乾，或牙痛，或耳鳴，或遍身流注，或腹痛，或發熱，增寒，或口吐酸水，或心腹氣痛，或下五色，服此用清玉散。

當歸酒洗

川芎

赤芍

生地黃

陳皮

半夏姜製

白茯苓

蒼朮米泔浸

香附

黃連

黃芩

柴胡去蘆

升麻

牡丹皮

甘草

右剉下劑，生薑煎服。

○一治婦人白帶，其効如神。

心身經傳

硫黃不拘多少，將豆腐剉去中一塊，入硫黃居中，上仍用豆腐蓋住，砂鍋底放稻草鋪之，放豆腐於內，上仍用草蓋入水，煮一日，頻頻添水。

至豆腐黑為度取出硫黃研為末將白芍紙包水濕火煨切片為末各等分合下處和勻水打麪糊為丸如梧桐子大每早空心用五分好燒酒下鍾送下服五日後即愈如未愈每早服一錢服至五日全愈

○一治婦人白帶男子白濁下淋
乾薑炮一兩百草霜一兩 為末每服一錢溫酒調下

○一治婦人赤白帶下不論年月深久不瘥
乾薑炒黑五錢 白芍酒炒二兩

右為細末每服一錢空心米飲調服

又方 白雞冠花為末每服三錢空心酒調下赤帶用赤雞冠花

又方 用鹿角燒灰存性為末好酒調下空心服二匙

又方 雞子開頂入硫黃末三分濕紙裹火煨嚼吃好燒酒下

又方 蒼朮米泔浸焙乾乾姜炮各等分為末每服二錢空心酒調服

又方 白芷四兩以石灰半斤淹三宿去灰炒焦為末清米飲空心調服

又方

硫黃五錢炒化胡椒四十九箇為末好酒調服

又方

硫黃五錢用烏梅肉三錢搗丸黃豆大每五丸空心酒送下

又方

黃荊子炒焦為末空心米飲調服以能燥濕痰也亦可以治心痛

治赤白帶下

五倍子炒桃仁炒去皮尖各等分為末每服二錢空心燒酒調服

○

一治婦人久患白帶瘦削無力倦怠欲睡腰膝痠痛飲食無味面黃目

腫煩熱小便淋瀝以十全大補湯去桂加車前子地骨皮鹿角膠大獲

全効

○

一婦人帶下四肢無力蓋四肢者土也此脾胃虛弱濕痰下注以補中

益氣湯兼歸脾湯二藥治之愈

○

一婦人年踰六旬內熱口乾勞則頭暈吐痰帶下或用化痰行氣前症

益甚飲食愈少肢體或麻或木恪服祛風化痰肢體常麻手足或冷或熱目

漸消前此症屬脾氣虛弱而不能生肺祛風之劑復損諸經也當滋化

源以補中益氣湯加白茯苓半夏炮乾薑如聖丹

白礬

蛇床子各等分

右為末醋糊為丸如彈子大，胎前為末薄綿裹，留得綠二三次許，服藥止，深入玉戶中，定坐半日，熱極再換，太抵此疾多，因子宮不熱，服藥於
○一治婦人帶下，腸有敗膿，淋露不已，腥穢殊甚，遂至臍腹更增冷痛，此蓋為敗膿所致，卒無已期，須以排膿乃已

白芷一兩

單葉紅葵根二兩，芍藥白者

白礬各五錢，研另研

除為末同以蠟丸梧子大，空心飯前米飲下十丸，或十五丸，無病者仍別他藥補之

五積散

方見中寒補中益氣湯

方見傷寒十全大補湯

方見補腎

歸脾湯

方見婦人虛勞

虛勞

夫人之生以氣血爲本人之病未有不先傷其氣血者世有室女重思積
想在心思慮過常多致勞損男子則神色先散女子則月水先閉何以
致然蓋憂愁思慮則傷心心傷則血逆竭血逆竭則神色先散而月水
先閉也火既受病不能榮養其子故不嗜食脾既虛則金氣虛故咳嗽
嗽既作水氣絕故四肢乾木氣不充故多怒髮焦筋痿體變五臟至此
成勞最爲難治或有以爲血熱用涼藥解殊不知血得熱則行冷則凝
九經水少漸至不通手足骨肉煩疼漸至羸瘦漸生潮熱脉來微數此
陰虛血熱陽往乘之水不能滅火火逼水涸當養陰血慎勿以藥通之
○一論治婦人以血旺氣衰爲本心生血肝藏血今血衰而氣盛若由心
氣虛耗又不能生血又不能制乎肺金使肺氣得以乘乎肝木肝之虛
損則不能藏血漸至枯涸不榮經絡因月信不調矣此藥專補心元之
虛抑其肺金之盛調和榮衛滋養血脉其疾自愈諸氣血過多虛勞
發熱及吐血衄血咳嗽喘上壅胸膈不舒虛勞熱嗽痰喘無汗諸

茯苓補心湯

當歸酒洗

川芎

白芍酒炒

懷熟地黃 陳皮

半夏湯泡炒

白茯苓去皮 桔梗去蘆

枳殼去穢 前胡去蘆各

乾葛

紫蘇各七分 人參

木香各五分 甘草三分

右劉一劑生薑棗子煎服。

○一論婦人諸虛百損五勞七傷經脈不調肢體羸瘦此藥專調經水滋
血脈補虛勞扶元氣健脾胃養心肺潤咽喉清頭目定心驚安神魄進
潮熱除骨蒸止諸嗽化痰涎以茶酒任調滿開胃氣利胸膈除痰癖消
煩渴散寒熱祛體疼大有奇効不能盡述。

濟陰至寶丹

當歸酒洗

白木去蘆炒 白芍酒炒

白茯苓去皮各 生知母去毛

貝母去心

香附道便炒 地骨皮

麥門冬去心 陳皮各八分

薄荷

柴胡

甘草各三分 右劉一劑生薑棗子煎服。

○一論婦人經血少，或經後發熱，盜汗，或思慮傷脾，不能攝血，以致步在或健忘，怔忡，驚悸，不寐，或心脾傷痛，時少食，或夢思傷脾，血虛發熱，或肢體作痛，太便秘，不調，或經後不准，補熱，肉熱，或癰腫流注，治法歸脾湯。

黃芪蜜水炒 人參

白朮去苦

白朮神木

當歸酒洗

遠志細切水浸 酸棗仁炒

龍眼肉絡

木香

甘草

各五分

右剉一劑 薑棗煎服

加味歸脾湯

治瘀血已去，或脾經失血，小腹疼痛，無邪發熱，盜汗，或脾傷不能攝血，或心脾傷痛，時少食，或夢思傷脾，血虛發熱，或肢體腫痛，太便秘，不調，或經後不准，補熱，肉熱，症依前方加紫胡、梔子、梔子。

○一論婦人血虛勞倦，五心煩熱，肢體疼痛，頭目昏沉，心忪煩，赤口燥咽乾，發熱盜汗，或食嗜，及血熱相搏，月水不調，臍腹脹痛，寒熱如瘧，及

治室女血弱陰虛榮衛不和痰涎潮熱肢體羸瘦以致滑蒸勞熱宜
逍遙散

當歸

白芍酒炒

白朮

去蘆炒

白茯苓

去皮柴胡

甘草多一錢

右剉煨薑一塊入薄荷少許水煎溫服○加牡丹皮山梔仁炒名加味
逍遙散

一婦人發熱齒痛日晡甚月水不調此脾經血虛加升麻去蘆後因怒
復痛仍以前藥加川芎而瘳

○一論婦人虛勞血氣脾胃虛損之極發熱痰嗽喘急之甚相火妄動肌
肉消削內股沉困夜出盜汗精神短少或太便秘澀或腹中積塊或癰
母癥瘕面黃肌瘦百藥罔效其

五仙湯

嫩黃芪

蜜水炒

揀參

去蘆

白朮

去蘆炒

當歸

酒洗各二錢

甘草

炙一錢

右劉下劑龍眼五個連肉七個水煎溫服○有熱加地骨皮知母○嗽加五味子桑白皮○痰加貝母半夏○渴加五味子麥門冬○吐血加生地黃犀角玄參茅根油○血虛加熟地黃白芍藥

○一論婦人血氣兩虛五心虛熱或白帶頻頻注下先賢有云婦人性悍必多燥火且少有不如意處心中燥急感池之火上燔五心如烈也宜十珍飲子

懷山藥

一錢

杜仲

錢半

人參

一錢

白朮

去蘆一錢

懷生地黃

半一錢

白茯苓

去皮七分

當歸

一錢

川芎

七分

白芍

酒炒一錢

甘草

三分

右劉棗二枚燂心七莖水煎空心服

○一治肝膽經症寒熱往來晡熱潮熱身熱默默不欲食或怒火口苦其轉咳嗽發熱或脇痛肢滿轉側不便兩脇痞悶或瀉痢或嘔吐酸水宜

小柴胡湯

柴胡二錢

黃芩

一錢半

人參

七分

半夏

一錢

甘草

五分

右劉一劑量事煎服。

加味小柴胡湯

治肝膽經風熱耳前後腫痛或結核欬痛或寒熱晡熱或經候不調等症卽小柴胡湯加梔子牡丹皮。

○一論腎虛發熱作渴咽痰小便淋瀝頭暈眼花咽燥唇裂齒不堅固腰腿酸軟自汗盜汗便血諸血朱瘡水泛爲痰之聖藥血虛發熱之神劑六味丸

懷生地

自製入兩用酒蒸至黑

山茱萸

酒蒸去核

乾山藥

各四兩

牡丹皮

白茯苓

去皮澤瀉各三兩

右爲末煉蜜爲丸梧子大每服三錢空心白滾水下。

○一論婦人經水不調或不通虛勞吐血衄血咳血便血發熱咳嗽盜汗痰喘心慌一切虛損勞怯骨蒸危篤等症並皆治之此方作湯服亦可滋陰地黃丸

懷熟地黄

養汁浸焙乾

懷山藥

二兩山茱萸酒蒸去核二兩

白茯苓

去皮

牡丹皮

澤瀉

去毛各一兩半

天門冬

去心麥門冬去心

生地黄

酒洗

知母

去毛

貝母

去心

當歸

酒洗

白芍

香附米

童便浸炒各二兩

右為細末

煉蜜為丸

如梧桐子大每服百丸空心鹽湯送下痰唾液姜

湯送下

○一論婦女五勞七情所傷骨蒸五心煩熱心虛怕驚絳水或前或後或

淡白或紫色時常注帶下或因煩勞性氣惱怒產後失調致赤白帶滲

及夜卧身體上下疼痛及午後神疲腰腿酸倦或心嘈又時飽悶及夢

寐不消或衝任下脈結癥瘕隱隱久服大有功效

白鳳丹

真正白絲毛烏骨雄雞一隻先以黃芪末二兩當歸末二兩甘草末五

錢三味和米粉七合勻作七分調成小塊雞食之約有六七日即死不

出血去毛腸不用。

當歸身

酒洗三兩

川芎二兩

白芍

酒炒三兩

懷生地黃

酒洗五兩

天門冬

去心一兩

人參一兩

丹參

水洗淨三兩

山藥三兩

山茱萸

酒蒸去核三兩

小茴

酒炒一兩

懷牛膝

去蘆酒洗二兩

木瓜

半一兩

鹿角霜

知母

炒去毛三兩

秦艽

去蘆二兩

銀柴胡二兩

胡黃連一兩

蜜寧

生甘草

一兩

麥門冬

去心二兩

右俱製如法，剉勻，將雞切作小塊，俱盛於磁罐內，用水二分，好酒二分。

米醋一分，罈口用柿漆紙封固，置大鍋內，桑柴火煮三晝夜，取出，日晒。

夜烘一乾，又入汁，拌又烘，晒以汁盡為度，為極細末，煉蜜和，杵千餘下。

丸如梧桐子大，每服百丸，空心淡鹽湯送下。

○一婦人為哭母吐血咳嗽，發熱盜汗，經水不行，此悲傷脾，以補中益氣。

湯加桔梗貝母知母，久服歸脾湯，送下六味丸。

○一婦人熱來復去，晝見夜伏，不時而動，或無定處，而作，口舌生瘡，在。

後脚起乃無根之火也。以下全大補湯加麥門五味子。

○一婦人患勞嗽不時發熱或時寒熱或用清熱之劑其熱益甚汗口乾兩足如炙遍身皆熱昏憤如醉良久熱止方甦或補熱至旦方止此陰虛而陽氣弱也。朝用六味丸料久用十全大補湯月餘諸症稍愈更兼以補中益氣湯兩月餘而愈。

求嗣

易曰天地絪縕萬物化醇男女媾精萬物化生則絪縕者升降凝聚之謂也媾精者配合交感之謂也必二氣合則生且生矣否則獨陰不成孤陽不生理有必然者知此則人之不成孕育者豈無由哉抑豈太婦竟無一交媾之遇哉遇而不適其會是亦獨陰孤陽之謂也。不知者謬於天命則泥矣。間雖有獨為資藥餌以養精血候月經以種孕育之說又多峻補以求詭遇則求嗣未得而害已隨之予之痛惜也久矣夫種子

之道有四：一曰擇地，二曰養種，三曰乘時，四曰拔虛。是也。蓋地則耕之，血也種則父之精也。時則精血交感之會也。虛則去舊生新之初也。予嘗聞之師曰：母不受胎，氣勝血衰故也。衰則傷於寒熱，感於七情，氣凝血滯，榮衛不和，則經水先後不一，多寡不均，謂之陰失其道。何以能受父之種子？氣虛血弱故也。弱則原於色慾過度，傷損五臟。五臟皆有精而藏於腎，精既弱，譬之射者力微，矢枉安能中的？謂之陽失其道。何以能施？究斯二者，皆由已之不能自寬，以至真元耗散，陰涸陽枯，遂成不孕者多矣。動輒歸咎天命，不亦誤哉？故必地盛則種可授，又必時與血俱得焉，則未有不懷孕而生子者矣。雖然，至難養者精與血。至難過者時與虛。苟不遇以養血之力，示以調經之宜，候以如期之法，則養血過者竟茫然矣。是知種子之法，以調經養精為首，而明藥須得平和。夫婦尤必各相保守，旬月之間，可使精與血俱盛。所待者時也。當夫月經一來，即記其時而等以三十時辰，乃兩月半也。至此積穢蕩滌，既新血

初生所謂時與虛者俱會矣當此時而有入道之感雖平生不孕者亦
孕矣尚何疑哉是乃屢試屢驗百發百中者也嗚呼是說也豈畔道云
乎哉蓋培植元氣顧養天真特資藥力以佐助之所謂人定亦可以勝
天者是也及其既孕將欲要定生男女先以父生年丁亥在上母生年
丁亥在下以受胎月居中是乾坎艮震陽象也是巽離坤兌陰象也可
預立其年其月為生男其年其月為生女可預定焉予敢統為圖後嗣
者告

書生男女歌

父母之年上下舉坐胎之月為中主乾坎艮震定是男巽離坤
兌決是女算男却生女三五九歲死算女却生男終以鬼來
纏若是正胎者書考不須言

乾三 坎三 艮三 震三 巳上是男胎 巽三 離三 坤三
兌三 巳上是女胎

千金種子方

進火之時至陰節間而止不爾則過子宮蓋深則少陰之分肅殺之方何以生化淺則厥陰之分融和之方故能發生所以受胎之處在淺不在深也非經後不可用事經後下日男二百女三百男此外皆不辰胎太風太雨太寒太暑陰晦日月蝕皆不可交接生子疇孽瘡痼四體不亮且自損壽

○一論九婦人無子多因七情所傷致使血衰氣盛經水不調或前或後或多或少或色淡如水或紫如血塊或崩漏帶下或肚腹疼痛或子宮虛冷不能受孕宜進此藥而効可通神

調經種玉湯

少參姚范川傳

當歸身

酒洗四錢

川芎四錢

白芍

酒炒三錢

熟地黃

酒蒸六錢

白茯苓

去皮三錢

陳皮三錢

香附米

炒六錢

吳茱萸

炒四錢

玄胡索

三錢

牡丹皮三錢

若先期三五日色紫者血虛有熱也加條芩三錢

若過期經水色淡者血虛有寒也加官桂乾薑炒艾葉醋炒各二錢
右側作四劑每一劑用生薑三片水一碗半煎至一碗空心溫服
臨臥服待經至之日服起一服一劑藥盡經止則當來雖即成孕
矣若未成孕經當斷期俟經來再服四劑必孕無疑矣百發百中
○一論此方常服順氣養血調經脉益子宮療腹痛除帶下種子屢効不
可盡述

種子濟陰丹

香附米四兩 一兩醋浸 一兩酒浸 一兩米泔浸 一兩童便浸
各浸三日焙乾爲末 益母草二兩已上二味忌鐵器
艾葉醋浸炒 真阿膠蛤粉炒成珠二兩當歸酒洗一川芎一兩
白芍鹽酒炒一兩 懷熟地黃姜汁炒二兩 陳皮去白一兩
半夏湯泡姜汁浸香油 白茯苓去破白朮去蘆土條芩炒一兩
牡丹皮酒洗一兩 吳茱萸湯泡五錢 玄胡索四錢 小茴香鹽酒炒五錢

沒藥五錢 川續斷酒洗一兩 麥門冬去心一兩 甘草炙三錢

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服白丸空心米湯送下溫酒服之

俱可氣虛加人參二兩一方加山藥石聚各一兩

○一論孕育子嗣全在調經理脾血氣充旺調其經候去其妬忌并服孕方自然有子。

調經月事湯

當歸酒洗一錢 川芎七分 白芍酒炒一錢 熟地黃姜汁陳皮八分

白朮去蘊一錢 香附酒炒一砂仁三分 丹參五分 條苓酒炒一錢

甘草多四分 水煎空心服

先期者熱加黃連姜汁炒七分 倍黃芩一後期者虛加黃芪炙

一錢 倍黃歸一腹痛者塊加玄胡索炒牡丹皮各一錢一發熱加

柴胡地骨皮一赤白帶下加柴胡升麻俱酒炒各七分半及姜汁炒

白茯苓蒼朮一米泔炒黃柏知母俱酒炒乾薑炮升陽除濕也一肥

者瘀脂滿子宮加南星半夏蒼朮茯苓○瘦怯者血少不能攝精信
芎歸○經血過多加炮姜五分荆芥穗炒八分地榆九分○經閉不
通加桃仁紅花蘇木○氣盛者加烏藥陳皮香附柴胡

○一治婦人陰血不足久無子者能使胎孕

六味地黃丸方見虛勞依本方全料加薑硬炒香附二兩煉蜜為丸服

○一治婦人無子仙方

烏鳳丸

香附米

各一斤四兩製酒糟煮便米泔

白茯苓

去皮四兩當歸二兩

川芎一兩

白芍一兩

陳皮

白朮

去蘆陳土炒一兩

山藥一兩

小茴香二兩吳茱萸

黃芪

連肉

酸棗仁

一兩六附子

黃芪

阿膠

黃柏一兩

知母一兩

懷生地黃

酒洗砂鍋內蒸黑

右用雄烏骨雞一隻用死去毛尿淨洗淨連骨搗爛同前藥末煉蜜為丸

丸每服二錢臨經之日每日三服半月見効多服秘生雙胎

補天育嗣丹 太方伯王如水傳

嫩鹿茸酥炙虎脛骨酥炙敗龜板酥炙補骨脂鹽水微炒二兩

懷生地黃去入碎內蒸一日用酒煎入兩好酒浸一宿山茱萸酒蒸六兩

懷山藥四兩白茯苓去皮切片乳汁浸酒乾再浸牡丹皮去皮切片乳汁浸酒乾再浸

澤瀉去心皮二兩天門冬甘枸杞子酒當歸身酒洗四

右忌鐵器為細末用

紫河車一具此乃混沌皮也又名濕元衣取首男胎者佳先用米泔水洗淨此乃初結之真氣也再入長流水浸一刻以取生氣取回入碗內放砂鍋內蒸一日極爛如糊取出先傾自然汁在藥末內略和勻此不元正氣汁也將河車放石臼內杵如泥却將藥末片同杵勻為丸如乾加錫煉蜜和勻為丸如梧子大每服三錢空心溫酒送下忌三百此至天元真氣以入補人玄妙不可言也

續嗣壯元丹

種子天下第一方

嫩鹿茸

一兩

真沉香

一兩

肉苁蓉

酒洗去甲

一兩

天門冬

一兩

甘枸杞子

一兩

麥門冬

一兩

揀參

一兩

熟地黃

酒洗去甲

一兩

巴戟

一兩

山茱萸

一兩

山藥

四兩

栝子仁

一兩

白茯苓

一兩

破蓬

五味

一兩

山茱萸

一兩

山茱萸

一兩

當歸

一兩

川杜仲

一兩

牛膝

一兩

杜絲

一兩

何首烏

一兩

米泔浸

一兩

一兩

一兩

一兩

一兩

小茴香

一兩

鹽炒

一兩

破故紙

一兩

一兩

一兩

一兩

一兩

一兩

一兩

一兩

一兩

一兩

一兩

一兩

一兩

一兩

一兩

一兩

石菖蒲

一兩

去毛

一兩

朱砂

五錢

一兩

一兩

一兩

一兩

一兩

一兩

一兩

一兩

一兩

一兩

一兩

一兩

一兩

一兩

一兩

右為細末

酒打

麴糊丸

如梧子大

每服四十丸

空心

溫鹽湯下

忌酒

忌

忌

忌

忌

忌

忌

忌

忌

忌

忌

忌

忌

忌

胡椒乾姜煎炒之物

專治虛損

傷事不舉

少弱多情

弱事不舉

少弱多情

弱事不舉

少弱多情

弱事不舉

少弱多情

弱事不舉

少弱多情

弱事不舉

少弱多情

弱事不舉

少弱多情

弱事不舉

少弱多情

弱事不舉

少弱多情

弱事不舉

成子嗣遺精白濁

五勞七傷

下切腐損之疾

無不應驗

臨臥再連服

三服

三服

三服

三服

三服

三服

三服

三服

三服

三服

三服

三服

三服

三服

三服

三服

魯府獨仙傳種子藥酒方

白茯苓

一兩

大紅棗

一兩

胡桃肉

一兩

白蜜

一兩

白蜜

一兩

白蜜

一兩

白蜜

一兩

白蜜

一兩

白蜜

一兩

白蜜

一兩

白蜜

白茯苓

一兩

大紅棗

一兩

胡桃肉

一兩

白蜜

一兩

白蜜

一兩

白蜜

一兩

白蜜

一兩

白蜜

一兩

白蜜

一兩

白蜜

一兩

白蜜

黃芪蜜炙

人參

白朮去蘆

當歸

川芎

白芍炒

生地黃

熟地黃

小茴

甘枸杞子

覆盆子

陳皮

沉香

木香

官桂

砂仁

甘草各五錢乳香

沒藥

遼五味子各三

右為細末共入蜜罈內和勻餅葉封口麪外固入罈內木柴火炙三炷
 香取出埋于土中三日去火毒每日早午晚三時男女各飲數盃勿令
 大醉安魂定魄改易容顏添髓駐精補虛益氣滋陰降火保元調經壯
 筋骨潤肌膚髮白再黑齒落更生目視有光心力無倦行步如飛暑
 不傷能除百病交媾而後生子也神秘不可傳與非人實之寶之

○一治婦人子宮虛冷帶下白淫面色痿黃四肢酸痛倦怠無力飲食減
 少經脈不調血無顏色肚腹時痛久無子息服藥更宜戒氣惱怒生
 冷其効如神

艾附暖宮丸

香附米

六兩 炒

當歸

三兩 炒

白芍

懷生地

酒蒸黑一兩

黃芪

炒二兩

川續斷

吳茱萸

三兩 官桂五錢

右為細末醋糊為丸如梧子大每五十丸空心淡醋湯下

○一論婦人氣盛於血變生諸症所以無子壽常頭暈腦滿怔忡皆服

抑氣散

香附米

童便白茯苓

陳皮

二兩 甘草炙一兩

右為末每二錢空心滾水調下

○一論婦人妬愛悞夫無子蓋正土入朝小人忌之妻色入室求婦妬之

咸宜此可免妬忌之病也

去妬丸

天門冬

去皮赤棗米

慧苡仁

去殼炒各四兩

右為末煉蜜為丸每服百丸食遠白湯送下婦人常服則不妬也

妊娠

經云陰脾陽別謂之有子。此是氣血和調陽施陰化也。診其手少陰脉動甚者，妊子也。少陰心脉也。心主血脉，又腎名胞門子戶。尺中腎脉也。尺中之脉按之不絕者，妊娠脉也。三部沉浮正等，按之無斷絕者，有娠也。又左手沉實為男，右手浮大為女；左右俱沉實生二男，左右俱浮大生二女。又尺脉左偏大為男，右偏大為女；左右俱大產二子。又左右手尺脉俱浮為產二男，不兩女作男生俱沉為產二女，不兩男作女生。又左手尺中脉浮大者男，右手尺脉沉細者女。又得太陰脉為男，得太陽脉為女。太陰脉沉，太陽脉浮，欲知男女遺面南行，還復呼之。左迴首是男，右迴首是女。又看上圓時，夫從後急呼之，左迴首是男，右迴首是女。婦人妊娠，其夫左邊乳房有核是男，右邊乳房有核是女。

妊娠一月名曰始形。飲食精熟，酸美受御宜食，太麥、無食腥辛之物，是謂

水貞足厥陰養之足厥陰者肝之脉也肝主血一月之時血流雄如不出故足厥陰養之足厥陰穴右足太指歧間白肉際是

姪娠二月名曰始膏無食腥辛之物居必靜處男子勿勞百節皆痛是謂始藏也足少陽養之足少陽者膽之脉也主於精二月之時兒精成於胞裏故足少陽養之足少陽穴在足小指間本節後附骨上寸陷中者是

姪娠三月始胎當此之時血不流形像始化未有定儀見物而變欲令見貴盛公主好人端坐莊嚴不欲令見僂僂佻佻醜惡形人及猿猴之類無食姜兔無懷刀繩欲得男者操弓矢射雉鷄乘肥馬於田野觀虎豹及走犬其欲得女者則著簪珂環珞弄珠璣欲令子美好端正者數觀白壁美玉看孔雀食鯉魚欲令兒多智日有力則噉牛心食木麥及麥子子賢良虛德則端心正坐清虛和一坐無邪席立無偏倚行無邪徑且無邪視耳無邪聽口無邪言心無邪念無妄喜怒無得思慮食無邪居

肝無精足思欲瓜果噉味酸煩好芬芳惡見穢臭是謂外象而變者也
手心主養之手心主者脉中精神內屬於心能混神故手心主養之手
心主穴在掌後橫文是診其妊娠脈滑疾重以手按之散者胎已三月
也

妊娠四月之時始受水精以成血脉其食宜稻稬其羹宜魚雁是謂盛養
以通耳目而行經絡洗浴遠避寒暑是手少陽養之手少陽者三焦之
脉也內屬於府四月之時見六府順成故手少陽養之手少陽穴在手
小指間本節後一寸是也診其妊娠四月欲知男女左脈疾爲男右脉
疾爲女左右俱疾爲生二女當此之時慎勿瀉之必致產後之殃何謂
也是手少陽三焦之脉內屬於三焦靜形體和心志節飲食

妊娠五月始受火精以成其氣胎必晏起洗浣衣服深其屋室厚其衣
朝吸天光以避寒殃其食宜稻麥其羹宜牛羊和以菜茹調以五味是
謂養氣以定五臟者也一本云宜食魚鼈是太陰養之足太陰脾之脉

主四季五月之時兒四肢皆成故足太陰養之足太陰穴在足內踝上
三寸也診其妊娠脈重手按之不陷但疾不滑者五月也又其脈微在
必向懷脈緊者必胞阻脈遲者必腹痛喘脈浮者必水懷爲腫

妊娠六月始受金精以成其筋欲微勞無得靜處出遊於野數觀走犬及
視走馬宜食熟爲猛獸之肉是謂變腠理筋以養其爪以牢其骨腎足
陽明養之足陽明者胃之脈主其口自六月之時兒口自皆成故足陽
明養之足陽明穴在大衝上一寸是也

妊娠七月始受木精以成其髓躬搖支無使定止動作屈伸居處必燥飲
食避寒常宜食稻抗以密膝理是謂養骨牢齒者也手太陰養之手太
陰者肺脈主皮毛七月之時兒皮毛已成故手太陰養之手太陰穴在
手大指本節後白肉際陷中是診其妊娠七月脈實大牢強者生男細
者死懷軀七月而不可知時時衄而轉筋者此爲軀衄時啞而動者非
軀也懷軀七月蒸下斗餘水其胎必倚而墮此非時孤漿預下故也

妊娠八月始受上精以成膚肉。心氣是謂氣。理而光澤。顏色手陽明養之。手陽明者大腸脉。大腸主九竅。八月之時。見九竅皆成。故手陽明養之。手陽明穴在大指本節後宛宛中。是診其妊娠八月脉實大牢強弦緊者。生沉細者死。

妊娠九月始受石精以成皮毛。木府百節莫不畢備。飲醴食甘。緩帶自持。而待之。是謂養毛髮。多才力足。少陰養之。足少陰者腎之脉。腎主續續。九月之時。見脉續續。皆成。故足少陰養之。足少陰穴在足內踝後微近下筋動脉是也。

妊娠十月五臟俱備。六府齊通。納天地於丹田。故使關節入神。威儀然可預修。滑胎方法也。

○一論婦人經脉不行。已經三月者。不脉不止。則是胎也。驗胎散

川芎爲末。每服一錢。空心艾葉煎湯調下。覺腹內微動。則有胎也。若服

後下日不動非胎必是經閉。

○一治婦人經水過月不來難明有無胎孕。

艾醋湯

用好醋炆艾服半盞後腹中脊太痛是身孕不為痛定無孕。

○一論婦女經候不行身無病似病狀有六而六脉俱勻乃是孕婦之脉也精神如故惡聞食氣或但嗜一物或大吐或時吐清水此名惡阻切勿作寒病治之宜服此藥如覺惡心嘔吐加丁香香生薑煎。

保生湯

人參二錢 白朮五錢 橘紅五錢 香附子五錢 烏藥五錢

甘草二錢 每剉一兩水一盞半生薑五片水煎七分去渣溫服不

拘時候或為米姜湯調亦可。

○一論惡阻謂婦人有孕惡心阻其飲食也宜服。

養胃湯

當歸酒洗

白芍酒炒

白朮去麋炒

白茯苓去皮 陳皮

半夏

湯洗切片用香油炒過不傷胎氣

香附

砂仁

神麋炒

香附炒各等分

甘草減半

右剉生薑三片。棗二枚。水煎溫服。

○一婦人有孕嘔吐不止。予用。

半夏薄汁炒用。一半。陳皮茯苓甘草用一半。生薑七片煎服立止。

○一論妊娠三月。其經月來三五次。但不多。飲食精神如故。此血盛有餘。

見大能飲。自不來矣。後果然。

○一論子煩。謂妊娠煩燥而悶亂心神也。宜進。

竹葉湯。

白茯苓

去皮 二錢 防風去蘆 一麥門冬去心 茯苓各一錢半

右剉。下劑竹葉五片。水煎溫服。

○一論子癰。謂妊娠痰涎潮熱。自中口禁。不省人事也。

養羊散

當歸酒洗

川芎

防風

獨活

白茯苓去皮

五加皮

薏苡仁

杏仁去皮

酸棗仁炒

木香

養羊角

甘草

右劉劉生薑五片水煎溫服

○一論見在腹中哭用多年空房下鼠火中土下塊令孕婦驚之即止

○一論子懸謂娘娘心胃腹筋難治胎氣不和心腹脹滿或臨產

驚恐氣結連白不下及胎前下切諸疾悉宜此方加減治之

紫蘇和氣飲

當歸酒洗

川芎

白芍酒炒

人參

紫蘇

陳皮

大腹皮

甘草

右劉劉生薑五片葱白七寸水煎溫服○腹痛加香附木香○咳嗽加

枳殼桑白皮○熱加黃芩○嘔吐加砂仁○泄瀉加白朮去蘖炒白茯苓

苓去皮。○感冒加羌活麻黃。○傷食加山楂香附。○氣惱加香附烏藥。
○一論子腫謂姙娠七八個月前後面目虛浮肢體腫滿也。宜
茯苓湯。

當歸

川芎

白芍藥

熟地黃

白朮去蘆炒

白茯苓

澤瀉

條芩

梔子炒

麥門冬去心

厚朴姜炒

甘草

右剉劑水煎溫服。

天仙散

天仙藤搗精炒香藤

紫蘇

陳皮

香附炒

烏藥

木瓜

甘草

右剉生薑煎服加蒼朮尤妙。

○一論子淋

謂姙娠小便澀痛頻數也。宜後方。

子淋散

麥門冬去心 赤茯苓

大腹皮

木通

甘草

右剉淡竹葉下皮煎空心服

○一論轉胞 謂妊娠卒不得小便也。因胎長逼近於胞，胞為所逼而側，令人數溲，胞即膀胱也。然子淋與轉胞相類，但小便頻數，澀澀而痛，為子淋；頻數出少而不痛，為轉胞。間有微痛，終是與淋不同，並宜五苓散加炒阿膠，又宜冬葵散治。孕婦轉胞，小便不通及男子小便不通，皆效。

冬葵散

冬葵子辛 兩

山梔子炒 兩

木通三錢

滑石半兩 研此藥難得，臨日可用

右剉下劑水下薑半煎八分溫服外以冬葵子滑石梔子為末田螺肉

搗膏或生葱汁調膏貼臍下立通。

○一妊娠轉胞不得小便者，用八物湯加半夏陳皮各二合湯服之，探吐以升提其氣，上竅通而下竅自利也。

○一論胎漏，謂姙娠有胎而血漏下，屬氣血虛而有熱也。
芎歸湯

當歸尾 川芎各五錢

右剉下剉好酒煎，入童便下，溫同服，一服立止如神。

膠艾四物湯 治症同前

當歸酒洗 川芎八分

真阿膠炒成珠八分

香附炒一錢 艾葉少許

粳米一撮 水煎服。

丁方加蒲黃炒一錢 陳皮七分 杜仲鹽水炒一錢 續斷一錢 甘草炒

四分 去艾葉不用 只用水煎服。

○一治胎動出血產門痛，黃連酒洗一錢 白朮酒洗三錢。

○一論胎動，謂姙娠因事跌仆，子死腹中，或墜下，若痛小已，口噤欲死，

用此藥探之，若子死腹中，立便逐下，若腹痛隨止，子母俱安，又治臨產

難生胞衣不下及產後血暈不省人事狀似中風肝筋暴露不止腹中
血刺疔痛血滯浮腫血入心經語言顛倒如見鬼神血風相搏身熱腹
疼或似瘡非瘡下切胎前產後狼狽垂死等症並皆治之宜
佛手散

當歸酒洗一兩

川芎七錢

右剉丁劑水煎將熟再入酒煎溫服○如口噤押開灌之如人行五里
許再灌之便醒立產○如胎漏下血不止以酒煎入重便下溫溫服
○一方治胎氣動用鯉魚下齒水煮熟并湯食之立刻下
○一因事動胎致胎不安動搖不已及下血者若四物湯合四君子湯
加條芩阿膠砂仁白芷桑寄生

○一論安胎謂安胎有因因病而胎動者但安胎母病其胎自安胎
不安因顧母病但安胎氣母病自瘥

○一論孕成之後覺氣不安或腹微痛或腰間作疼或飲食不美或胎動

下血及五六箇月常服數劑其妙

安胎飲

當歸身

酒洗一錢

川芎八分

白芍

酒炒一錢

熟地黃

酒蒸一錢

條芩一錢半

白朮

去油二錢

砂仁

一錢

陳皮

一錢

蘇梗

八分

甘草

四分

炒

右剉一劑

水煎溫服

○下血不止

加蒲黃

炒

阿膠

炒

各一錢

○腹痛加

香附

醋炒

枳殼

炒

各一錢

○一論

半產

謂婦人懷孕

血氣虛弱

不能養

以致數月而臨也

○一論

半產

謂婦人懷孕

血氣虛弱

不能養

以致數月而臨也

○一論

半產

謂婦人懷孕

血氣虛弱

不能養

以致數月而臨也

○一論

芎歸補中湯

黃芪

蜜水炒

人參

白朮

去蘆炒

當歸

川芎

白芍

炒

乾薑

炒

阿膠

炒

五味子

杜仲

蜜酒炒

木香

炒

甘草

炙

水煎

溫服

○一論

陽施陰化

胎孕乃成

血氣虛弱

不能養

以致數月而臨也

○一論

半產

謂婦人懷孕

血氣虛弱

不能養

以致數月而臨也

○一論

情內火便動

亦能墮胎

火能消物

造化自然

子見一婦

但有孕三個月

而墮胎者

此火動之

故也

○一論

半產

謂婦人懷孕

血氣虛弱

月左右必墮胎其脉左手大而無力重按則澀知其血少以其止帶只
補中氣使血自榮時正初復教以濃煎白朮湯下黃芩末一錢與數士
劑得保全而生一子也蓋孕至三月上屬相火所以易墮

安胎丸 妊娠宜常服之

當歸酒洗 川芎

白芍酒炒

條芩略一

白朮

去蘆炒五錢

右為細末酒糊為丸如梧子大每服五十丸茶湯任下空心日服三次
清熱之劑也瘦人血少有熱胎動不安素慣孕產者皆宜服之以清其
源而後無患也○一婦人小產常服此以保胎為十月完足相連肉去
心四兩砂仁炒二兩共為末每二三匙米飲調下日服三四次
○一論婦人常懷小產久而不育者可服過七個月不必服
千金保孕丹

當歸酒洗

熟地黃

酒蒸

人參

一兩半白朮

去蘆炒

條芩二兩

陳皮一兩

香附子

童便浸一兩

續斷

酒浸

杜仲

酒炒一兩

右為細末糯米飯丸梧子大每服七十丸白湯下

一方去人參加砂仁川芎阿膠艾葉益母草棗肉為丸

○一論婦人曾經小產今有孕預先培補為妙大凡婦人墮胎只是奇經廢弛衝任帶服受虧而然宜服此湯大有益也

加味八珍湯

黃芪二錢

人參二錢

白朮

錢去蘆一

甘草

炙三分

當歸

酒洗一錢

川芎七分

白芍

酒炒一錢

知母

一錢

熟地黃

酒洗一錢

防風

七分

山藥一錢

升麻

四分

黃柏

酒炙四分

炒褐色

益智仁

研八分

已上剉一劑水煎溫服

○一治婦人每懷胎至三四月必墮不肯服藥

用四五年老母雞煮湯入紅棗小黃米煮粥食之不斃而胎竟固全至月滿而生

○一論妊娠身居富貴口厭甘肥憂樂不常食物不節既飽便卧致令胎

胎肥厚根蒂堅牢行動艱難因致臨產必與難生不月可服此藥止
二服補其血而順其氣使子易生而胎易落也又治小產瘀血腹痛及
胎衣不下

保生無憂散

當歸

川芎

白芍各七分乳香

枳殼各一錢
麩炒

木香

甘草各五分血餘炭灰四

右剉一劑水煎溫服

○一治胎肥壅隘動止艱辛臨月服之續胎易產
瘦胎散

枳殼五錢 香附子三錢甘草一錢半

右爲末每服二錢百沸湯調服

○一論姙娠至八九個月服數劑甚好令易產腹亦少痛
達生散

當歸身酒洗白芍酒炒

白朮

夫油薑炒各二錢

人參

陳皮

紫蘇各五分

大腹皮

洗

錢甘草

各三分

或加砂仁

五分枳殼炒八

分尤妙

右剉一劑葱五根水煎服

如胎肥氣喘加黃楊腦七個此黃楊樹梢兒也此物能瘦胎不實

夏加黃芩春加川芎冬加砂仁○氣虛倍加參朮○氣實倍陳皮香

附○血虛倍當歸加地黃○性急多怒加柴胡○有熱加黃芩○食

少加砂仁神曲○渴加麥門冬○食易飽多加黃楊腦○有熱加半

夏姜湯泡切片香油炒黃芩○腹痛加木香

○一論妊娠七八月間服此胎氣欬束令人易產凡患產難者多由內熱

灼其胞液以致臨產之際乾澀而難或脾氣怯弱不能運化精微而食

胞液不足亦產難之道也故用白朮煑其脾土而培萬物之母用

黃芩瀉其胎熱其胎熱瀉火而存胞液乃陳皮者取其辛利能流動中

氣化其肥甘使胎氣不滯兒身不肥耳此束胎之義也

東胎丸

茯苓^{上錢}

陳皮三兩

黃芩

夏八分兩 春秋七錢 冬五錢

白朮二兩

右為末酒糊丸梧子大每五十丸米湯送下

一孕婦胎痛

當歸

川芎

條芩

酒炒

阿膠炒

香附

玄胡索

水煎溫服

治孕婦心痛

玄胡索

五錢當歸一錢

乳香五分

甘草一錢

右剉水煎溫服

治孕婦腹痛或胎動不安

砂仁

炒二兩 條芩 必紫黑一兩半

白朮

去蘆炒一兩

右為末每服三錢紫蘇湯調服

一治孕婦腰痛狀不可忍

補骨脂不拘多少瓦上炒令香熟為細末嚼核桃肉半箇空心溫酒調下二錢

○一治姙娠偶因所觸或墮傷致胎動不安腹中痛不忍苟砂仁不拘多少研斗內盛慢火炒令熟透去皮搗羅為末每服二錢用熱酒調下須臾覺腹中胎動虛極熱即胎已安神效

○一治姙娠太便閉澀艱難

當歸

川芎

白芍

生地黃

枳殼去穢

黃連

右剉水煎溫服

○一論姙娠下痢赤白腹中疝痛

當歸五分

白芍一錢

白朮五分

白茯苓五分澤瀉五分

木香三分

檳榔三分

黃連五分

黃芩五分

甘草三分

右切作丁服水一盞半煎至一盞空心溫服如白痢腹痛甚者恐有寒也去苓連加乾薑炒三分

○一治妊娠腹痛下痢膿血不止

黃連八分

厚朴姜炒

阿膠炒

當歸各六分 艾葉

黃柏

乾薑各五分

右爲末空心米飲調下方寸匕日三服

○一論妊娠泄瀉腸鳴腹痛手足厥逆

人參

白朮炒

乾姜炒

甘草炙

加肉桂砂仁

右切生薑三斤煮取二枚水煎空心溫服

○一論孕婦癰疾寒熱相半并產後癰疾

當歸

川芎

白芍

青皮

陳皮

半夏

白茯苓

枳實

草果

良薑

紫蘇

乾葛

甘草

右剉薑棗煎服日服

○一論妊娠風寒咳嗽痰喘滿悶

百合蒸

貝母

紫苑

白芍

前胡

赤茯苓

去皮桔梗

甘草

生薑五片水煎服

○

論孕婦咳嗽用貝母麝炒為末所砂糖拌勻在加雞頭實大口蛤壳

○

論妊娠忽然口噤吐沫不省人事言語錯亂

二合湯

當歸酒洗

川芎

白芍酒炒

懷生地黃

陳皮

半夏煨炮青

白茯苓

去皮麥門冬去心遠志甘草水石菖蒲

竹茹

甘草

右劉生薑水煎服

○

論妊娠不語非病也聞有此者不須服藥臨產日但服劉生薑水

○

論婦人懷鬼胎如抱一死

○

脉經云設令官中人若寒婦無失常夜夢寐交通和氣或懷似胎而成

癰瘕之疾急驚風下血

助鬼丹

吳茱萸

川烏頭

秦艽

柴胡

白礬煅炒

巴戟去心

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服七丸蜜酒送下出惡物即愈

一論妊娠癥瘕痞塊及二者疑似之間者久服安養胎氣消散結塊

消補丸

枳殼炒

檳榔

黃連

黃柏

黃芩

當歸

阿膠炒

木香各一兩

右為末水丸梧子大不拘時溫米飲下二十九日進二三服

一論妊娠或時有白濁白帶而下

四物湯合二陳湯加蒼朮杜蘅龍骨等藥

一論妊娠遺尿失禁

白薇

白芍酒炒各等分

右為細末酒調方寸七日三服

○一論妊娠瘰癧見紅

當歸身

熟地黄

天門冬

去心麥門冬

去心紫苑

各五分

桑白皮

蜜炙

杏仁

甘草

桔梗

片苓

五味子

阿膠

炒各二分半

右剉加竹茹

下開水煎

臨服入小煎汁同服

○一婦人每孕不數月即墮

忽又孕三月患嘔吐吞酸

噎氣嘈雜腸鳴泄

瀉胃脘疼痛

瀉胃脘疼痛

陳皮

一錢

半夏

麩炒七分

白茯苓

一錢

白朮

去蘆一錢

神曲

炒五分

香附

炒一錢

霍香

四分

黃連

姜汁炒三分

川芎

甘草

炙四分

右剉薑棗煎服

○一治胎孕九個月將產消息用猪肚

下箇依常法煮葱五味煮熟

不盡再服不與別人食

○一妊娠誤服毒藥及諸般毒藥物

○一妊娠誤服毒藥及諸般毒藥物

○一妊娠誤服毒藥及諸般毒藥物

○一妊娠誤服毒藥及諸般毒藥物

○一妊娠誤服毒藥及諸般毒藥物

白扁豆生去皮為細末清米飲調方寸匕神効。

○一妊娠下血脹涼血之藥下血益甚食少體倦此脾氣虛而不能攝血以補中益氣湯治之乃愈。

○一治婦人墮胎昏憤不時吐痰自用養血化痰之劑昏憤不食自汗發摘痰涎壅出投以為中風欲用扶風化痰予曰此屬脾氣虛寒所致遂用十全大補湯去程加知母防風山藥升麻黃耆杜若杏仁。

○一妊娠氣喘痰盛諸藥不應問治於余詢之云素有白帶始於目下浮兩月餘其面亦然此陰虛有痰飲也用六味丸料數劑而愈。

○一妊娠每至五月肢體倦怠飲食無味先兩足腫漸至遍身後及頭面此是脾腫氣虛朝用補中益氣夕用六君子加蘇梗而愈凡治妊娠母泥其月數但見其經症候使用某藥為善。

妊娠傷寒治法

○一治妊娠傷寒護胎法

井底泥

青黛

伏龍肝

右為末調勻塗於孕婦臍中二寸許如乾再塗上以保胎孕也

○一治妊娠傷寒傷風勿輕服藥發熱頭疼惡風身痛

紫蘇

陳皮

香附

川芎

白芷

甘草

右剉一劑薑葱煎服

加味四物湯

專治妊娠傷寒諸症

當歸身

川芎

白芍

熟地黃各等分

右剉每服五六錢水煎溫服

如妊娠傷寒頭痛身熱無汗脈浮緊加麻黃細辛

如妊娠傷寒中風表裏自汗頭痛項強身熱惡寒脈浮而弱加黃芪

如妊娠中風濕之氣肢節煩疼脈浮而熱頭痛加防風蒼朮

如妊娠傷寒胸膈滿痛脈弦加柴胡黃芩

如妊娘傷寒太便硬小便赤氣滿而脈沉數加大黃生桃仁去皮尖是炒
如妊娘傷寒小便不利加茯苓澤瀉如妊娘傷寒小便赤赤白黃赤
如妊娘傷寒四肢拘急身涼微汗腹中痛脈沉而遲加附子去脂桂少用
如妊娘傷寒畜血症加生地黄大黃酒浸

如妊娘傷寒身熱太渴蒸蒸加熟脈長而大者加石膏知母

如妊娘傷寒下後過解而不愈加黃芩枳實加錦紋加升麻連翹

如妊娘傷寒下後咳嗽不止者加人參五味子

如妊娘傷寒下後虛痞腹滿加厚朴枳實是炒

如妊娘傷寒不得眠者加梔子黃芩

如妊娘傷寒汗後血漏不止者胎氣損者加阿膠炙甘草黃芪

如妊娘脈浮頭腫自利腹中痛去地黃加桂枝炒

如妊娘傷寒自利腹中痛飲食不下脈沉者去地黃川芎加白朮炙甘草

如妊娘傷寒頭痛項強身熱中乾胸脇疼用生地黄加柴胡前胡人參

妊娠食忌

受孕之後不可食之物切宜忌食非徒有感動胎氣之戒然於物理亦有厭忌者設戒不能戒忌非特延月難產亦能令兒破形母頭可謂戒

食雞肉糯米令食令子生寸白蟲
食鯉魚鱸魚及鷄子令兒成疳多瘡
食羊肉令子缺唇蓋鬼乃不能而孕生子則口中吐出是以忌焉
鴨子共桑椹同食令子倒生心寒
雀肉合豆醬食之令子面生黧黑子
食米漿絕產
食山羊肉令子多病
食蛇膽令子傾生
食驢驘馬肉延月難產

食雞令子項短及損胎
食豆醬合雀食之墮胎
食牛肉令子不耻多淫
食子薑令子多指生瘡
食蝦蟇鮮魚令兒瘡癩

如此之難無不驗者則知聖人胎教之法豈非慮有自其然乎

產育

○一產母面赤舌青母活子死母面青舌赤口沫出子活母死母唇皆青
口兩邊沫出身重寒熱市下青黑反舌上冷遇此症者子母俱死不可
○一胎產橫逆多因坐草太早努力過多兒身未轉或已破水其血必乾
致胎難轉若先露脚謂之逆先露手謂之橫當以小絹針於兒手足心
針入一二分三四刺之以鹽塗其上輕輕送入兒得痛驚轉下縮卽當
回順而生矣

○一論產難或橫或倒死胎爛胎於腹中者幾覺腹痛或腰重欲坐草時
將神祇飲卽溫飲下蓋便覺心下開豁如渴又飲下蓋覺下重便難更
無諸苦橫生倒逆不過三服卽正子死腹中不過三服卽下能保母子
兩全最爲神驗有一婦人橫產手出至臍腫脹但欲截其手不保其生

厚服催生藥不効以此藥濃煎一碗與服少頃甦醒再與一碗用時少時忽云我骨節都拆開了快扶起我血水俱下拔出死胎全不費力可謂更生以此救八百登百中。

催生神祚飲

生梓樹刺枝如小指大者一握淨洗半碎一葉一刺者處處有之。

甘草五錢 右剉一大劑新汲水一碗半八新瓦罐內用紙三重密封之文武火煎八分溫服。

○一治胎婦臨產艱難或十二日不下者服此自然轉動下生。

三合濟生湯

當歸五錢 川芎二錢 枳殼去穢炒二錢 紫蘇八分 香附炒一錢半

大腹皮姜汁洗一錢 甘草七分

右剉水煎待腰痛甚服之即產。

催生如意散 臨產腰痛方可服之。

人多一錢 乳香一錢 辰砂五分

右爲末臨產之時急用雞子清一個調藥用生薑自然汁調開冷服如橫生倒產卽時順正子母均安。

○一論姪媛子外或未死胎已動寧歸湯加紫蘇酒水煎服死者卽下未死者卽安。

○一論胎衣既破其血已涸或元氣困憊用八珍湯斤許再加益母草二斤水數碗煎熟時時飲之飲盡再煎○孕婦臨月預服此藥自進一服則子易生而胞易落也。

○一論橫生逆產須更不救子母俱亡。

蛇退一條 蟬退十四箇胎髮丁五並燒灰

右爲末分作三服酒調下須更進一服仰臥露時卽下。

○一治產難澀心不下者蛇退燒灰同麝少許研細溫酒調下立產。

○一論臨產破水三五日不下將死未絕者江月池傳。

魚鱗用大者三十。香油浸過，燈上燒之，滴下油入酒內，其灰研末酒調服立下。

○一論難產，產婦胞乾，胎不得下。

香油、蜂蜜各一兩，和勻入銅鉢內，慢火煎一二沸，掠去沫，調白滑石末一兩，攪勻，頓服外，以油蜜摩其腹，上下。

○一婦人分娩艱難，產子已死，元氣勞傷，用油紙捻燒斷臍帶，取其陽氣以補之。俄間兒啼作聲，若以刀物如常斷之，其母亦難保生。

夫子死腹中者，多因驚動太早，或觸犯禁，或抱腰太重，或頻探拭，水胞衣先破，血水先盡，而胎乾涸故耳。其候產母唇舌皆青者，子母俱死。若舌黑或脹悶甚者，然其子已死矣。先以平胃散一兩，酒水各半煎，却投朴硝半兩，即熟皮硝服，或用硝一兩以童便調下亦妙。

○一治胎衣不下，雞子清三個去黃，以酸醋一合和之，吸入口中即下。

○一方治胞衣不下，即嚼生葱齒數根，即下。

○一治胞衣不下

紅花二兩炒清酒五爵法之溫服此乃氣弱而瘀血凝於胞也故用清酒壯其氣紅花敗其血

○一胞衣不下因產母元氣虛薄者用芎歸湯倍桂以溫之自下

○一治婦人難產及橫生逆產如神

用蛇退炒焦爲末每五分酒調下

○一治必胎不下難治難產及橫生倒生

用桂心爲末每二錢痛陣密時用溫酒調下

○一治用麝香五分爲末加桂末二錢酒和服

○一治產後胎衣不下惡血冲心腹中血塊

錦紋大黃二兩爲末以好醋半升熬成膏丸如梧子大以醋化五丸服

之須臾卽下又治月經不通

○一治橫生逆產胎死腹中不下

分毫畢腰子下付輕粉一分。於香一分共搗作三四丸辰砂為衣。下
○一治胎衣不下。令產婦嚼自己髮尾於口中令嚥噦衣即下。
○一論婦人分娩交骨不開或五七日不下垂死者。
活命芍歸湯

川芎

當歸各一兩

生男女婦人髮

一握燒灰存性

自死龜殼

一個如無古龜者亦可酥炙

右為末每二兩水煎服良久不問生死胎即下

○一論妊娠十月滿足或因恣情內傷或患潮熱之症又兼產前多飲熱
毒之物瘀血相搏七情怒氣所傷臨產頓逆之厄惶惶不謹輒用藥
下手取胎觸死胎兒在腹不能所治今傳秘方防此之禍但服一二帖
加烏金丸二顆甚効

活水無憂散

益母草二兩

大枳殼一兩

當歸四錢

川芎一錢

白芍二錢

生地黄二錢 官桂一錢 急性子四錢 陳皮一錢 甘草八分

生鯉魚一箇

右各剉分二服。每用水三碗煎至一碗。臨服之時加好醋一匙。每三碗加烏金丸一顆。如其死胎不下。急取無根水再煎。藥渣連進二服。即救其性命。奧妙不可輕傳。

○一論臨產艱難。橫生逆產。胎死不下。及產後諸病。

烏金丸

真阿膠炒一兩 八錢蛤粉 蘇木一兩 艾葉端午日收去梗二兩

穀麥二芽晒乾各二兩 龍衣即蛇退腰全者一條焙乾又要蛇頭

右共為細末。煉蜜為丸。如芡實大。每用一丸。重便和酒化下。

九修合此藥。揀天月二德。天醫生氣。吉日凝神。安席洒掃。淨室。出太極而生兩儀。九宮而分八卦。所忌婦人雞犬聲喊音。要在夜間寂靜。齋戒至誠。先念淨口淨心淨身淨天地神呪。又念呪曰。天精精地靈靈。精。

靈寶左朝北斗右朝北辰人逢此藥各保安寧急急如律令

○一治橫生逆產產三五日不下死在須臾葉師師周傳

用從往下蛇退一條長尺餘者燒灰存性鴛鴦等分為末黃蠟為丸

一箇皮硝化水吞下

○一治姙婦交骨不開產門不開皆由元氣虛弱胎前失於調攝以致血

氣不能運達而然也交骨不開陰氣虛也用活命芍歸湯補中益氣湯

產門不開者氣血虛也用十全大補湯活命芍歸湯方見前

○一治難產兼胞衣不下及死胎不下

巴三輩七脫索錢細研如泥入麝香搗作餅兒臍下貼

須臾子母便分張

○一治用車麻子十四粒去殼研塗兩脚心衣即下可即浣去如不大則

腸出如此時就以此藥貼頂心縮回其腸多用此藥不妨如婦人則貼

○一治難產或橫或逆或血海乾涸或胎死不下惶惶無措死在須臾

存者傳 皮硝五分 煅牡蠣三錢 獨活或寒天可加大附子煨去皮 三

右用好酒半鍾重使半鍾入硝煎一二沸溫服立下百發百中

○一治胎死腹中或產母氣之安頓產道乾澀或手足冷腹痛

即五積散見中寒依本方去麻黃加川烏附子南星阿膠炒木香香

補中益氣湯方見內傷十全大補湯方見補益

○一治女人出生腸用脚盆盛貯其腸取半煎水洗過薑水其滑洗過

則腸滑後用冷水噴胸前使患者因咳嗽氣則腸收又用人以手托之

使腸入內後用馬恰篋水洗用酒搽於門口上女人眠倒脚高起此過

一時即愈

十三
產後

脈產後扶康清血服却宜虛叔和云新產之服緩滑去實大弦急死來

傷亡口潰痰不調死沉細附骨不絕生

凡產畢不問腹痛不痛有病無病以童子小便和酒共一鍾溫服則百病
不生少坐上牀俯臥膝仰臥不時喚醒及以醋茶湯或用水洗及
燒漆器更以手從心捍至臍下使惡露不滯如此三日以防血暈血逆
酒雖行血亦不可多恐引血入四肢且能昏暈宜頻食白粥少許月
之後宜食猪蹄少許仍慎言語七情寒暑梳頭洗足以百日為度若氣
血素弱者不計日月否則患手足腰腿痠疼等症名曰產勞最難治療
初產時不可問是男女恐因言語而泄瀉或以愛憎而動氣皆能致病
不可觸宿恐致虛驚不可刮舌恐傷心氣不可刮齒恐致血逆須血氣
平復方可治事犯時微若秋毫成病重如山獄所不戒哉
天產後血暈其由有三有用心使力而暈者有下血多而暈者有下血少
而暈者其暈雖同其治特異若下血多而暈者當補血以芍歸湯為主
或惡露不止者倍炒黑乾姜止之若去血少而暈者當神散去之但凡
血暈不省人事用大炭置產婦傍以醋沃之使醋氣薰入產人口鼻

者亦駐重者亦省人事矣。○一法用韭菜細切盛于有嚼瓶中以熱醋沃之急封瓶口以瓶嘴納產婦鼻孔中插之即醒。○一法用舊漆器燒煙薰之即醒。○一法用荆木穗研末用二分吹鼻即醒。○一法用鹿角燒存性每一錢酒灌下即醒。

夫產後發熱有去血過多者有勞力過傷者有惡露不盡者有飲食未節者有感冒風寒者有來食傷寒者有因傷挾外感者有三日蒸乳者俱能發熱增寒并身疼腹痛不可相類而用藥也。

○一論去血過多發熱者脈必虛大無力內無煩楚此非有餘之熱乃陰虛生內熱耳以歸木保產湯主之。

○一論有傷力發熱或早起勞動發熱者亦用歸木保產湯主之。

○一論惡露不盡亦發熱惡寒必脇肋脹滿連大小腹有塊作痛者宜黑神散主之。

○一論脾胃虛弱飲食必難消化以致滯滯發熱必有惡氣作酸惡食。

臭而口中無味。胸膈飽悶。氣口脈必緊盛。發熱惡寒。頭痛。宜理脾。○一論感冒風寒而發熱者。其脈弦而緊。或惡露欠通。頭疼身痛。發熱惡寒。手足厥冷。肚腹疼痛。宜五積散主之。此藥祛除敗血。生新血。調和榮衛。滋養臟腑。使陰陽不相勝負。邪氣不能相干。則無寒熱之患。並加米醋少許同煎。本方去麻黃。方見中寒。

○一論傷寒夾食。必惡食。胸痞腹痛。頭疼發熱。氣口脈來緊盛。宜行氣香蘇散。下消下發而治之。方見飲食。

○一論內傷元氣。外感風寒。其脈洪大而虛。其症身熱而煩。頭痛惡寒而渴。自汗氣高而喘。宜補中益氣湯加減治之。方見內傷。

○一論產後蒸乳發熱惡寒者。必乳間脹硬疼痛。令產母振乳汁通其熱自除。不藥而愈。

○一論產後發熱惡寒。或口眼喎斜等症。皆是氣血虛甚。當以大補氣血為主。若左手脈不足。補血藥多於補氣藥。右手脈不足。補氣藥多於補血藥。

○一論產後中風切不可便作風治不可服小續命湯之類宜大補氣血若中風口噤乃血虛而風入夾口筋得風則急故口噤也若角弓反張乃体虛而風入於諸陽之經故獨腰背彎急如角弓反張之狀也以歸水保產湯去香附乾薑加秦艽羌活又宜當歸荆芥各等分水下酒少許煎七分灌之如口噤用匙輕開微灌下但下咽即効又宜荆芥略炒爲末每服三錢黑豆淋酒調下重便亦可

○一論產後虛羸諸病惟宜十全大補湯此藥性溫平補養血氣壯健脾胃乃諸虛百損第一方也

○一產後血暈者乃下血過多而眩暈也不省人事者氣血大脫而神不用也故用人參剉作劑水煎溫服蓋人參甘溫益元氣之品可以回氣可以生血身熱氣急者加重便一爵身寒氣弱者加大附子三錢外以炭火以醪醑沃之使醪氣薰蒸入鼻則能收斂神効

○一論產後諸疾以未治之大補氣血爲主此方治一切諸病氣血虛損

脾胃怯弱。飲食不化。或去血過多。或飲食失節。或怒氣相冲。以致
熱惡寒。自汗。口乾。心煩喘急。心腹疼痛。頭眩。眼黑。耳鳴等症。不語昏憤。
不省人事。並皆治之。

歸來保產湯

當歸酒洗 一川芎

錢

白芍

錢

熟地黃

酒蒸

白朮

去蘆炒一錢

白茯苓

錢

陳皮

八分

香附米

童便炒一錢

乾薑

炒黑八分

甘草炙三分 氣虛加入參七分

右剉下劑。生薑三片。棗一枚。水煎服。○如去血過多。倍芎歸乾姜。○

一胸膈脹滿。加枳實炒。砂仁厚朴姜炒。山楂去子。○兩脇肋痛。加青

皮去穢肉桂。○小腹陣痛。加玄胡索。桃仁紅花蘇木甚者加三棱莪朮

俱煨醋炒。○有汁。加黃芪蜜水炒。酸棗仁炒。○口乾苦。加麥門冬去心

○身不發熱。小腹痛。不可忍。用桃仁去皮搗爛五錢。韭菜汁和酒送下

立効。○惡露不行。加益母草牡丹皮桃仁入童便酒同服。○吐痰加牛

夏貝母○咳嗽不止加遠五味桑白皮○着氣喘加烏藥○腎憤口喘
不語加荊芥穗

○一論婦人產後下十八證服之如神

照神散

棕皮灰

當歸酒洗

赤芍

白芍

生地黃

熟地黃

香附米炒

玄胡索

乾姜炮

五靈脂

蒲黃砂各一

沉香

乳香各五錢

莪朮

紅花

大黑豆

右為細末每服二錢溫酒童便調下

一胞衣不下敗血攻心眩暈欲絕服此即愈

一將產血多兒食不盡餘血裹胎難產服此棄子救母

一臨產用力太早兒不及轉橫生到出亦當急救母命

一子死腹中母必肢體冷痛口角出沫指甲青黑服此即出

一惡露未盡失而不治又過酸鹹收斂之物因而得崩漏

一血暈眼危起坐不得。

一血迷心或不能言。

一敗血乘虛散流四肢浮腫。

一敗血為害口渴舌燥作寒作熱似瘧。

一敗血入心煩躁發狂言語錯亂或見鬼神似癲。

一月中飲冷敗血凝聚腹痛難忍或致瀉痢。

一敗血停留肢節間遍身疼痛。

一敗血結聚小便閉澀大便艱難。

一肺竅鼻中氣黑。

一敗血流入小腸小便出血。

一敗血冲心喉中氣急發喘。

一敗血滯脾胃中心腹脹滿嘔吐似翻胃。

一產後諸般怪症難以名狀者多是敗血所致服此立効真仙方也。

○一治產後心腹疼痛瘀血不行或臍枕作痠危急之甚。

當歸三錢

川芎二錢

白芷

官桂

玄胡索

牡丹皮

蒲黃

五靈脂

沒藥各一錢白芍酒炒三錢

右剉一劑水煎入童便空心服。

○一治產後小腹痛作。有塊。脹滿。而痛。以四物湯加玄胡索。紅花。木香。牛膝。一論。產後停食。胸膈飽悶。身發寒熱。不思飲食。

理脾湯

蒼朮米泔浸一錢 陳皮一錢 厚朴姜汁一錢半 砂仁七分 神麴炒一錢

山查去核一錢 麥芽炒一錢 乾薑炒八分 甘草炙二分

右剉一劑。生薑三片。水煎服。○泄瀉加白朮。白茯苓。○太便閉加桃仁。

紅花。○小便閉澀。加大腹皮。

○一治產後三日。牙關緊急。眼目直視。四肢厥冷。乾姜炒黑五錢。水煎。入

童便。溫服。立効。

○一論產後暈倒。不省人事。眼黑耳鳴等症。并治中風不省人事。口吐涎。

加味佛手散

當歸 川芎 荆芥各等分

右剉。一木剉水煎。入童便。溫服。

○一論產後惡露不快腰疼小腹痛時作寒熱惡痛不思飲食不治又積惡血月水不調又療心痛小腸氣痛血氣痛欲死者又治心腹疼痛及兒枕痛不可忍又或血迷心竅不省人事又治北人青筋症用三棱酒失笑散

五靈脂

水淘去砂醋煮

真蒲黃

炒各等分

右剉酒煎溫服○丁法為細末每服三錢醋醋熬成膏白湯化下痛甚加川芎肉桂玄胡索各二錢

○一論產婦小腹作痛忽牙關緊急灌以失笑散良久即甦又用四物湯加炮乾薑白朮陳皮

○一治產後血虛昏暈不醒以四物湯加入參白朮茯苓炮乾薑香附

○一論產後瘀血心腹疼痛或發熱惡露者以四物湯加玄胡索香附桃仁紅花青皮澤蘭牡丹皮水煎重服若以手按腹愈痛此是瘀血為患宜服此藥或失笑散消之

若按之反不痛是血虛宜四物湯加參朮茯苓

若痛而作嘔是胃虛宜六君子湯○若痛如作瀉者宜六君子湯加乾薑炒白芍酒炒

○一論勞者產中之名也產中虛脫喘乏作寒作熱病外瘡狀名曰瘵勞此是虛之氣血不相順接虛故作寒壅故作熱無時休息症似瘵實非瘵也治宜大補氣血使其氣血順接則病愈矣故用人參補氣當歸補血糯米益胃葱豉醒脾而猪腎者取其以類相從能補系胞之區也猪腎湯治產後虛勞發熱盜汗

人參

當歸各等分

猪腰子一片白糯米半合葱白三根

淡豆豉一合

以水煮米熟取清汁十盞入藥二錢煎至八分不拘時服

○一方治產後虛勞發熱

猪腰子一對去白膜切作柳葉片用鹽酒拌先用糯米一合入葱椒

○一治產後發熱自汗肢體疼痛名曰蘇合

當歸羊肉湯

當歸酒洗 人參各七錢 黃芪一兩 生薑五錢

右判用羊肉斤五煮清汁五大盞去肉入前藥煎至四盞去渣傳不眠早

○一論產婦牙關緊急腰背反張四肢抽搐兩目連翳此去血過多元氣

虧損陰火熾盛宜

十全大補湯方見補益 加炮薑丁剉而甦又散劑而安

○一論產婦筋掣臂軟肌肉掣動此氣血俱虛用十全大補湯而愈

○一論產後血邪心神恍惚言語失度睡臥不安宜

茯神散

白茯神去皮 人參 龍齒研 琥珀研 赤芍

黃芪 牛膝去蘆各 生地黃一錢 桂心五分

右判每服用水煎服

○論曰產後不語者何答曰人心有七孔三毛產後虛弱多致停積敗血閉於心竅神智不能明了又心氣通於舌心氣閉塞則舌亦強矣故令不語如此但服此藥

八珍散治產後敗血停蓄於心迷塞心竅舌強不語

人參

五菖蒲

懷生地黃

川芎各一兩細辛一錢

防風

辰砂

另研各甘草一錢

右為末每下錢薄荷湯調下不拘時服

○一論產後咳逆不止

用乾柿一個切碎以水一盞煎至水半分熱呷之即止

○一論產後汗出不止

嫩黃芪

熟地黃

牡蠣粉

白朮

去蘆炒

麥門冬

去心

防風

去蘆

白茯苓

去皮

當歸酒洗

右判紅聚二枚水煎溫服

○一論產後消渴飲水不正

當歸酒洗 川芎

白芍酒炒 生地黃 麥門冬去心

五味子 知母去毛

白茯苓去皮黃芪蜜水炒甘草

右判水煎溫服

○一論產後胸痞腹脹

當歸酒洗 川芎

白芍酒炒 白朮去蘆炒 白茯苓去皮

陳皮 半夏湯泡姜砂仁

香附炒 厚朴姜汁炒

甘草 生薑煎服

○一論產後瘧疾

當歸酒洗 一川芎一錢

白芍酒炒 一白朮去蘆炒 白茯苓去皮

柴胡八分 青皮分 甘草三分

右判水煎服

○一論產婦血痢小便不通臍腹疼痛以生馬齒莧搗爛取汁三六合煎沸下蜜一合調頓服即愈

○一治產後痢疾不問赤白主方

當歸酒洗

川芎

白芍炒

白朮

去蘆炒

白茯苓

陳皮

木香

香附炒

神麴炒

乾薑炒

甘草炙

右剉水煎溫服○不思飲食加砂仁○小便不利加澤瀉

○一論產後痢疾久不止者以四君子湯加黃芪棗殼

○一治產後泄瀉

人參

白朮

去蘆土

白茯苓

去皮陳皮

白芍炒

乾姜炒

澤瀉

厚朴

姜汁炒

砂仁

當歸酒炒

甘草炙

右剉姜棗煎服

○一治產後嘔吐

陳皮

半夏

湯泡

姜

白朮

去蘆炒

白茯苓

去皮

砂仁

藿香

人參

神麴炒

當歸酒洗

甘草炙

右坐生薑五片水煎溫服

○一治產後頭痛

黃芪蜜水炒人參

白朮去蘂炒陳皮

當歸

升麻

柴胡

細辛

蔓荊子

川芎

藁本

甘草

右坐生薑三片水煎服

○一治產後咳嗽痰喘熱

當歸酒洗

川芎

白芍酒炒

熟地黃

陳皮

牛夏煨汁泡

白茯苓去皮

枳殼炒

橘梗去蘂

前胡

蘇梗

乾葛

人參

木香

甘草

右剉散姜棗水煎服

○一產婦咳嗽痰盛面赤口乾內熱肺熱微作無時此陰火上升當補脾

腎遂用補中益氣湯六味地黃丸而愈

一論產婦產後下血諸藥不應飲食少思肢體倦怠此中氣虛弱用補中益氣湯加吳茱炒黃連五分四劑頓止但怔忡少寐盜汗未止用歸脾湯治之而愈

一論產後太便秘不通因去血過多太腸乾澀或血虛火燥乾澀不可計其日期飲食數多用藥通之潤之必待腹滿腸脹自欲去而不能者乃結在直腸宜用猪膽汁潤之若服苦寒藥潤通反傷中焦元氣或愈加難通或通而瀉不能止必成敗症若屬血虛火燥用加味逍遙散氣血俱虛八珍湯慎不可用麻子杏仁枳殼之類

一產前產後太便秘不通

當歸酒洗

川芎

防風去蘆

枳殼炒

各甘草炙二錢

石剉薑棗煎服忌動風之物用蜜導之亦妙

一產後五七日太便秘切不宜妄服藥丸用大麥芽炒爲末每服二錢

湯調下與粥間服

○一論產後胞損小便淋瀝不止

人參二錢半

白朮

去蘆二錢

白茯苓

去皮

黃芪

錢半

一陳皮

一錢

桃仁

去皮尖

甘草

炙五分

右剉下劑水煎猪羊胞後入藥煎服

○一論婦人子宮腫大二白損落下片殊類猪肝已而面黃體倦飲食不

味肉熱時熱自汗盜汗用十全大補湯二十餘劑諸症悉愈仍復生

○一論產婦陰門不閉發熱惡寒用十全大補湯加五味子數劑而發熱

退又用補中益氣湯加五味子數劑而缺若初產腫脹或發熱而不閉

者用加味逍遙散若腫既消而不閉者補中益氣湯切忌寒涼之劑陰

門不閉用石灰煎湯先熏後洗一方用荆芥藿香臭椿根皮煎湯薰洗

○一論產後陰門痛極不可忍

桃仁泡去皮尖研如泥塗之即已

○一論產後陰戶極痒不可忍

食鹽二兩卷之即止

○一論產後生腸不收皆由氣虛血弱所以懸下但養氣和血其物自收

人參 白朮 去蘆炒 黃芪 銀炒 當歸 川芎

甘草炙 右剉水煎服若懸二白則入升麻五分升提之日用熱

手心常熨腰肚但腰肚氣暖其物亦收

○一治產後生腸不收

草麻子去殼研成膏貼頭項心即收內服補中益氣湯倍升麻六葉

胡加益母草三錢

○一論產後因于死經斷不行下自小腹忽痛陰戶內有物如石硬塞之

而痛不禁此乃石瘕也

當歸酒洗 川芎 白芍酒炒 生地黃 桃仁去皮尖

紅花 大黃 三棱 檳榔 玄胡索

澤瀉 香附 血竭 水煎空心服

○一論產後有種疾。鬱冒則多汗。汗則大便閉。故難於用藥。唯此藥最嘉。
二子飲

蘇子

火麻子 去殼二味各半合淨洗研極細用水再研取汁

一益分十次煮粥啜之此粥不惟產後可服太抵老人諸虛損人風補

○一論產後陰戶腫大用吳茱萸煎湯洗之

○一產婦惡寒發熱余欲用八珍加炮薑湯治之其家知醫以為風寒用亦

柴胡湯余曰寒熱不時乃氣血虛不信仍服一劑汗出不止諸病不絕

煩熱作渴肢體抽搐余用十全大補二劑益甚脈洪大重按如無仍以

前湯加附子四劑稍緩數劑而安

○一產婦渴痢年餘形體骨立肉熱脯熱自汗盜汗口舌糜爛口吐痰涎

碗許脈洪大重按全無此命門火衰脾土虛寒而假熱然痰者乃脾虛

不能統攝歸元也用八味丸補火以生土用補中益氣湯兼補脾金而

健其脾胃

小產

小產重於大產。蓋大產如栗熟自脫。小產如生採破其皮殼斷其根蒂。豈不重於大產。但人輕忽致死者多矣。治法宜補形氣生新血去瘀血。若未足月痛而欲產。芎歸補中湯倍加知母止之。若產而血不止。人參黃芪湯補之。若產而心腹痛。芎歸川芎湯止之。胎氣弱而小產。有八珍湯固之。若出血過多而發熱。聖愈湯汗不止。急用獨參湯發熱煩躁。肉瞤筋惕。八珍湯大渴面赤。脈洪而虛。芎歸補血湯。卽黃芪二兩。當歸三錢是也。身熱面赤。脈沉而微。四君薑附。東垣云。晝發熱而夜安靜。是陽氣自旺於陽分也。晝安靜而夜發熱躁。是陽氣下陷於陰中也。如晝夜俱發熱者。是裏陽無陰也。當峻補其陰。王太僕云。如大寒而甚熱。之不熱是無火也。熱來復去。晝見夜伏。夜發晝止。時動而動。是無火也。如大熱而甚寒之不寒。是無水也。熱動復止。倏忽待來。時動時止。是無水也。

陽氣自旺者補中益氣湯陽氣陷於陰者四物二道湯即四物加胡連川連是也重陽無陰者四物湯無火者八味丸無水者六味丸

○一論小產氣虛血下不止宜

人參

黃芪蜜炒

當歸

白朮去蘆炒

白芍酒炒

艾葉醋炒各一錢

阿膠炒二錢右剉下劑水煎服。

○一論氣血虛半產宜

芎歸補中湯方見婦族

○一論小產後瘀血心腹疼痛或發熱惡寒

當歸川芎湯

當歸

川芎

白芍炒

熟地黃

玄胡索

桃仁

紅花

香附

青皮

澤蘭

牡丹皮

右水煎入童便好酒各半盞同服

右小產腹痛以手按腹愈痛此是瘀血為患宜用此藥或失笑散或若按之返不痛此是血虛宜用四物參苓白朮若痛如作嘔此是胃虛宜用六君子若痛而作瀉此是脾虛宜用六君子送二神丸

○一妊娠五月服剪紅丸而墮腹中脹痛服破血之劑益甚以手按之益痛余曰此峻藥重傷脾胃受惠用八珍倍入參黃芪加半夏乳香沒藥二劑而痛止數劑而全愈

○一婦人年二十餘疫疾墮胎時咳服清肺解表喘急不寐請治余以病脾土虛不能生肺金藥損益甚先與補中益氣加茯苓半夏五味炮姜四劑漸愈往視之又與八珍加五味及十全大補湯全愈

○一小產下血不止此氣虛之甚也以補中益氣湯去升柴加白芍川芎香附砂仁艾葉阿膠炒

乳病

乳房陽明所經乳頭厥陰所屬乳子之母不知調養忽怒所逆鬱則行遏
厚味所釀以致厥陰之氣不行故竅不得通而汁不得出陽明之血滯
鬱致熱甚而化膿亦有所乳之子隔有滯痰口氣燥熱含乳而理熱氣
所吹遂生結核於初起時便須忍痛揉令稍軟吮令汁透自可消散失
此不治必成癰癰治法疎厥陰之滯以青皮清陽明之熱細研石膏行
汗濁之血以生肌草之節清腫導毒以瓜蒌子或加沒藥青橘葉皂角
刺金銀花當歸或湯或散或加減隨意消息然須以少酒佐之若加以
艾火兩三壯於腫處其効尤捷不可輒用針力必至危困若不得於夫
不得於姑舅愛怒鬱悶所夕積聚氣消四所氣壅逆遂成癰癰如木
某子不痛不痒數十年後方為癰癰名曰奶岩以其癰形如岩凹似巖穴
也不可治矣若於如生之際便能消釋病根使心清神安然後施之治
法亦有所安之理

一論有兒者名為外吹乳有孕者名為內吹乳可以急治宜服

立効散

白芷

貝母

各等分爲末每服二錢好酒調服○若無乳行加漏蘆酒煎調服

○一論婦人乳腫作痛欲成癰毒宜

神効瓜蒌散

大瓜蒌黃熟者丁箇連皮子穰以重重布包火煨搗爛每丁劑半箇

白芷一錢半玄參二錢

升麻五分

歸尾二錢

桔梗一錢

連翹二錢

柴胡一錢

青皮一錢

川芎八分

天花粉一錢半

知母一錢

木通一錢

穿山甲

炒錢木鱉子

二箇玄胡索二錢

右剉一劑水煎溫服

○一治婦人患吹乳腫痛未成膿者用生半夏丁箇爲末將葱白半寸搗

和爲丸綿絮塞鼻一夜即愈左乳塞右鼻右乳塞左鼻神効

○一外敷吹乳方

葱一大把搗爛作餅厚攤乳上將瓦罐盛灰火撲在葱上蒸出汗即消腫痛甚妙或內將紫蘇煎湯頻服

○一治婦人吹乳

韭菜地中蚯蚓糞研細末醋調厚敷於上乾則再易三次即愈

○一治吹乳用益元散五錢用豆豉葱白湯調下頻服即愈

○一治吹乳法

入患家門房上或墻頭地下摘草四指長以手捺默念我佛面前一科蓮結下子來獻西方金頭娘子害吹奶奶問左邊右邊意者應欠實告再說吹口氣來腎即出不可回顧將草手心緊捺出放在墻縫以土厚蓋不可透風即能止痛消腫妙哉

○一法治吹乳用黃紙書山田火大人五字貼乳上立効

○一論婦人年五十外乳癰初已而又致穿破不得收功者宜

衝脉飲子

黃芪每斤 人參一錢半 白朮一錢

茯苓七分 當歸身二錢 白芍一錢 生地黃一錢

柴胡五分 青皮五分 宜木瓜四分 皂角子一錢 甘草三分

右剉一劑水煎頻服。○太便不通加火麻仁炒二錢黃連酒少二錢

一論內外吹乳乳癰腫痛已成未成服之立瘡

牙皂燒存性蛤粉炒過等分為末每服五錢好頭生酒調下以醋為度

熱服出汗立愈外用巴豆三箇燒存性香油調敷放癰頭上上用膏藥

貼之四圍用鐵槌散

白芨 白薇 白芷稍 赤芍稍 為末蜜調敷瘡四圍立愈

○一治內外吹乳及潰漿服之立効

黃芪 人參 當歸 川芎 白芍

木通 天花粉 連翹 漏蘆 青皮炒

橘蒞 防風 白芷 貝母 瓜瓞

穿山甲少

皂角刺

乳香

甘草

水煎食後臨臥服

○一論乳癰乳癰已成化膿為水去成即消治乳之方甚多獨此神效
癰瘡毒尤妙無比名神効瓜蒌散

瓜蒌大者兩

當歸酒洗

甘草各五錢

乳香另研

沒藥另研各二

錢

右作二劑用酒三碗煎至二碗分三次飲之更以消敷患處一切癰疽

腫毒便毒皆効

補遺

○一治吹乳腫痛不可忍者

升麻

甘草節

白芷稍

青皮

歸尾

連翹

貝母

金銀花

瓜蒌仁倍用

橘葉片

右剉水煎入酒半碗同服不拘時

○一治乳癰風神方

北細辛一錢 白芷稍八分 歸尾一錢 赤芍八分 防風一錢
莪朮八分 桔梗八分 烏藥一錢 麻黃三錢 小甘草三分
右剉一剉水煎加熟酒同服以渣搗患處出汗為度

乳岩

婦人奶岩始有核腫如贅其子大不痛不痒五七年方成瘡初便宜多服
疎氣行血之藥須情思如意則可愈如成瘡之後則如岩穴之開或如
人口有唇赤汁膿水浸淫胸脇氣攻疼痛用五灰膏去其腐肉生新肉
漸漸收斂此症多生於憂鬱積忿中年婦人未破者尚可治成瘡者終
不可治宜服

十六味流氣飲

當歸

川芎

白芍酒炒

黃芪蜜水炒人參

官桂

厚朴姜炒

桔梗

枳殼去穢 烏藥

木香

檳榔

白芷

防風

紫蘇

甘草

乳癰加青皮。○亦治癰疹後餘毒作癰痛。

右劉生薑煎服。

○一治婦人乳岩久不愈者。

樺皮

油核桃殼等分燒灰存

桔礬

輕粉二味加

共為末香油調敷。

○一治婦人乳癰或乳岩初起先服荆防敗毒散下劑以敗其毒次進蒲公英連根葉洗淨搗汁入酒飲之將渣敷患處立消其敗毒散即人參敗毒散方見傷寒去人參加防風荆芥連翹是也。

○一婦人年踰三十每怒後乳內作痛或腫此肝火所致與小柴胡合四物湯加青皮桔梗香附枳殼而愈彼欲絕去病根自服流氣飲遂致朝寒暮熱益加腫毒此氣血被損而然予與八珍湯三十餘劑喜其年壯元氣易復而得愈也。

○一婦人乳內腫一塊如雞子大旁則作痛久而不消服托裏散不效。乳勞症也屬肝經血少所致。先與神効瓜蒌散四劑更服托裏散之。服之退再服八珍湯倍加香附夏枯草蒲公英仍間服前散月餘而消亦有乳疽一症其狀腫硬木悶雖破而不潰腫亦不消尤當急服此散及隔蒜灸斯二症乃七情所傷氣血所損亦勞症也宜戒怒節飲食慎起居否則不治。

○一婦人患乳癰氣血頗實但瘡口不合百法不應予與瓜蒌神効散四劑少可更與數劑及豆豉餅灸之而愈又一婦人患此未潰亦與此藥三劑而消良甫云如有乳勞便服此藥可杜絕病根如毒已成能化膿為水毒未成者則從大小便中散之。

神効瓜蒌散方見前小柴胡湯方見婦人虛勞四物湯八珍湯俱見補益

通乳

○一論婦人素稟怯弱血氣虛耗產後無乳宜補養之劑用
當歸補血湯

當歸身酒洗五錢

嫩黃芩蜜水炒一兩

右剉一劑葱白十根煎服

○一論產後乳脈不行身體壯熱疼痛頭目昏痛此涼膈壓熱下乳
玉露散

當歸分一錢三川芎五錢

芍藥一錢半人參一錢半白茯苓二錢半

白芷五錢

桔梗炒五錢甘草二錢半

右剉水煎臨卧溫服○如煩熱甚太便秘結加大黃一錢二分金銀花
乳脈不行結成癰腫疼痛黃芩蜜水炒當歸金銀花甘草各二錢半水煎入
酒半鍾食後溫服

○一方上乳

三母散

牡蠣

知母

貝母

為細末以豬蹄湯調下

○一論產後乳汁絕少用猪蹄一隻重四兩先水煎兩小時同通草再煎去渣食後服之又用木梳頭上梳垢取下另流者尤如梳頭于大指服七八丸空心順流水下

○一論產後氣血不足經血衰弱乳汁減少

猪蹄_{下截}四兩 通草二兩 川芎一兩 穿山甲_{十四片} 甘草一錢

右用水五升煮汁飲之忌生冷避風寒夏月不宜朱蓋更以葱乳煎之

○一治乳汁不通

通草七分 瞿麥 柴胡 天花粉_{各一錢} 桔梗二錢

青皮 白芷 木通 赤芍 連翹

甘草各五分 水煎食後服更摩乳房

○一治乳婦思慮滯結乳汁不行宜

湧泉散

王不留行_{酒洗} 白丁香 漏蘆 天花粉 白芷_{鹽炒}

穿山甲 炒黃色各五錢

方為細末每服三錢食後用猪蹄湯調服

○一治乳汁不行

核桃仁十箇去皮搗爛

穿山甲末一錢 黃酒調服

○一治產婦少乳

穿山甲 天花粉各五錢

入猪蹄水裏合燉去渣服之立愈

○一婦人產後子而無乳服下乳藥但作脹子謂不乳皆氣血所化今脹而無乳是血氣竭而津液亡也當補其氣血自然有乳矣乃與八珍湯倍加參朮少加肉桂十數劑奏効

斷乳

○一論小兒三四歲或五六歲當斷乳不肯斷者宜用

斷乳盡胃膏

山梔子

三個燒灰存性

雄黃少許

辰砂少許

右三味爲末入生麻油罨粉各少許調勻候兒睡抹于兩眉上醒來便不食未効再抹

○一論婦人欲斷乳方

歸尾

赤芍

紅花酒洗

牛膝酒洗

水煎臨臥服

○一論婦人血氣方盛乳房作脹或無兒吃乳脹痛增寒熱麥芽一二兩炒水煎服立消其耗散血氣如此何脾胃虛弱飲食不消方中多用之一云麥芽最消腎若氣血虛而乳汁自出者宜十全大補湯服之其子多不育

婦人通治

夫通治方者蓋胎前產後一切雜症皆可治也或一方而治數症不可入於專門皆是嘗試之有驗者雖曰通治亦不可膠柱而鼓瑟也

○一論婦人胎前產後諸病三十六種冷血風八十二種風邪氣中風淋
 瀝血聚胎孕不安死胎不下胞衣不落一服立効產後腹內臍下如刀
 刺赤白帶下嘔逆填塞心氣煩滿懷胎近產一白一丸臨產不覺痛者
 經脈不通或來頻併飲食無味面赤唇焦手足頑麻遍身生黑點血斑
 者產後中風傷寒體如板者麻黃湯研化服

神祕萬靈丹

何首烏

去皮用黑豆拌九蒸九晒忌鐵器

當歸酒洗

兩頭尖各五錢

川烏

火炮去尖

草烏

水煮過去尖

大茴香

川芎

人參

去蘆

防風

去蘆尾

白芷

荊芥穗

桔梗

米泔浸

甘草炙

麻黃

用本煮三沸去渣

天麻

已上十二味各二兩

白朮

去蘆米泔浸

木香不見火

遠細辛

血竭

另研已上各五錢

蒼朮

半斤米泔水

乾為末

洗過入酒浸一宿晒

右共二十一味俱為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸細嚼普酒送下
 ○一論婦人胎前產後一切之症効甚大

濟陰返魂丹

益母草五月端午六月六採根葉洗于鹽乾不拘多少

右爲細末煉蜜爲丸如彈子大每服下丸細嚼米飲吞下

一胎前臍腹刺痛胎動不安下血不止水煎秦艽米湯或當歸湯亦可

一胎前產後臍腹作痛作聲或寒熱往來狀如瘧疾者俱溫米湯下

一產後井產後各先用一九重便酒化下安魂定魄血氣自然調順諸病不生又能破血養胎息調經絡功效不能盡述

一產後胎衣不下落在胞中及產前一切產難橫生不順死胎經閉不下脹滿腹中悶心煩妙益湯下

一產後中風牙關緊急半身不遂失音不語童使酒各半送下

一產後氣喘咳嗽胸膈不利惡心口中吐酸水面自浮腫兩脇疼痛舉動失力者溫酒下

一產後兩太陽痛吹心忪氣短肌體羸瘦不思飲食血風身熱手足頑麻

百節疼痛溫米湯送下。

一產後眼前黑暗血暈血熱口渴煩悶如見鬼神狂言不省人事薄荷自然汁下如無生者煎乾薄荷湯下及童便酒各半送下。

一產後面垢煩赤五心煩熱或結成血塊腹脇奔痛時發寒熱有冷汗者童便酒各半送下。

一產後未經滿月血氣不通咳嗽四肢無力臨睡自汗不止月水不調久而不治則為骨蒸之疾童便酒下。

一產後鼻衄口乾舌黑童便酒各半送下。

一產後太小便不通煩燥口苦者薄荷自然汁下如無生者煎乾薄荷湯下。

一產後痢疾米湯下。

一產後漏血水煎米湯下。

一產後赤白帶下煎膠艾湯下。

一血崩漏下糯米湯下。

一勒奶痛或成癰為米水調塗乳上一宿自瘳或生搗爛敷上亦可。

一婦人久無子息溫酒下服至一月決有驗。

○一論此方治產前產後腹痛體熱頭疼及諸疾癰產了未進別物即生服此藥能除諸疾逐敗血生新血

佛手散 一名芎歸湯

川芎

當歸酒洗三兩

右剉水酒各半煎溫服

一治諸般失血 傷胎去血 產後去血 血崩去血 金瘡去血

援牙去血不止

一切去血過多心煩眩暈悶絕不省人事頭重目暗塞頭欲倒悉能治之

一產後眩暈宜加酒炒芍藥治之

一產後腹痛不可忍者加桂心等分酒與童便煎服立効名桂香散

一姙娠子死或未死胎動不安酒水同煎連進數服若已死服之便下未

死其胎即安此經累効萬不失一

一姙娠臨月服之則縮胎易產治產後諸疾

一治虛損羸乏腹中疝痛往來寒熱吸吸少氣不能支持頭眩自汗腹內拘急每服用精羊肉二兩置十片水煎熟溫服

一婦人室女心腹疝痛經脉不調用水煎服

一姙娠胎氣不安產後諸疾加酒煎服

一婦人血氣上喘下腫二味等分爲細末每二錢空心艾湯調服

一產後虛損敗血衝心腹脹氣絕者神効

一難生倒橫子死腹中先用黑豆一大合炒熱水下蠶入童便下蠶桑末

四錢煎至一盞分爲二服未効再作

一產後惡血注心迷悶喘急腹痛後用黑豆加生薑自然汁半合煎服

一臟毒下血每服一錢半炒入槐花末半錢水煎服三白取下血塊即愈

一產後頭痛加荆芥煎服 一吐血亦宜服之

女聖丸

香附米乃女中之聖藥以其氣香則氣無滯氣也味酸能降無道之火

其性勇毅，移陽可解。婦女鬱結多怒之偏，本草云：是氣世多言。氣男子不敢服，非也。生春去皮毛，用一斤，淨分作四製。一用鹽水加桂汁浸透，略炒。主降痰調下部血。一用米醋浸透，熬熟，略炒。主款氣補血。一用山梔仁四兩同炒，去梔子不用。主降鬱火。一用童便洗過，不炒為末。一方加芎歸各二兩，共為末，酒煮麴糊為丸。如梧桐子大，每五七十九丸，隨引子送下。○經水不調，酒送下。○胎前諸病，艾湯下。○產後諸病，芎歸湯下。○胸脇脹滿，用薑湯下。○頭暈薄荷荊芥湯。入薑汁下。○白帶非冷，乃自庚辛金來，主分心氣所致，用小茴香湯或木香湯。○其餘病者，與男子同症，隨意用引，不能者只用白湯下。

婦人雜病

○一論室女寡婦，師尼居風體倦，乍寒乍熱，面赤心煩，或時自汗，症類時疫，但肝脈弦長，欲男子而不可得者。

斷慾丸 一名抑陰丸

生地黃 二兩酒浸并爛

黃芩 五錢

硬柴胡 各五錢 赤芍 一兩

秦艽 五錢

右為末。加煉蜜少許。丸如梧子大。每服五十丸。烏梅煎湯下。

○一論。羣居獨陰。無陽慾心萌而多不遂。是以惡寒發熱。全無瘧者。

柴胡抑肝散

蒼朮 炒一錢 香附 一錢

川芎 七分

神麴 炒八分 山梔 炒一錢

連翹 五分

柴胡 二錢半 青皮 炒二錢 赤芍 一錢半 生地黃 五分

牡丹皮 一錢

地骨皮 一錢 右對水煎服

○一論。婦人與鬼交通者。由賊時虛神不守。故鬼氣得病。其狀不殊。

見人。如有對悞時。獨言笑。或時悲泣。是也。氣息遲伏。或如鳥獸。言其邪。

為病也。又脉來綿綿。不知度數。而顏色不變。乃亦是此候也。宜。

安神散

白茯苓去皮木一兩半

白茯苓去皮人參

石菖蒲全一兩

赤小豆半兩

右剉水煎溫服

○一論婦人心氣不足精神恍惚夜夢顛倒與鬼交過證言錯亂或驚悸恐怖悲憂慘戚虛煩少睡喜憂不常夜多盜汗飲食無味頭目眩暈服補養氣血安神鎮心有此妙香散

妙香散

黃芪一兩 人參五錢

白茯苓去皮一兩 白茯苓去皮 山藥美汁炒

遠志甘草炮過去心一兩

木香二錢半 桔梗五錢 甘草炙五錢

麝香研一錢另辰砂三錢另研

右為細末每服二錢不拘時溫酒調服

○一論婦人陰腫者是虛損受風邪所致胸絡虛而有風邪客之風氣乘於陰與血氣相搏金氣否滯滕理壅閉不泄越故令腫也宜

真清散

石菖蒲

當歸

秦艽

吳茱萸

右剉葱白五寸。水煎空心服。

○一治婦人陰中腫痛不可忍洗法

艾葉五兩

防風三兩

大戟二兩

右剉水煎熱洗切宜避風冷

一洗法

小麥

朴硝

白礬

五倍子

右剉同葱白煮熱水洗之

○一論婦人陰中腫痛者其蟲所為三蟲在於腸胃之間因臟虛三蟲動信蝕於陰內其蟲作熱微則為痒重乃痛也宜將軍散

大黃微炒

黃芩

黃蘗各一兩

赤芍

玄參

丹參

山茱萸取肉蛇床子各五錢

右爲細末每二食前溫酒調下

○一治陰痒以小蘇木煎多少水煮湯熱洗日三次用之蒜煮湯亦可

一方用杏仁燒作灰承熱綿裹納陰中日二易之

○一治婦人陰冷痒方

遠志二分 乾薑生

蓮花各三分蛇床子 五味子各四分

右爲細末先以皂屎塗陰門中然後綿裹二錢納陰中熱卽爲効

一方以硫黃末煎湯洗

○一治陰門下脫先以淡竹根煎水洗次用

五倍子 白礬 爲末參之

○又方

用溫鹽湯洗軟用五靈脂燒煙薰之次用草麻子研爛塗頂上吸人卽洗去

○一治婦人陰中生瘡

杏仁燒末

雄黃

礬石

麝香少許

右四味研細末和傳陰中。

一治婦人陰戶作痒。

用豬肝炙燥納入陰戶則蟲俱引出而痒自止。

一治女人生門硬如石衣攢着痛不可忍。

青魚膽七箇或鯽魚膽七箇亦好用絲綿二三錢燒灰存性同魚膽調

取鴨毛搽上立効其硬不過半個時即軟。

一治女人生門耆出流黃臭水作痛取錦蘭二三錢燒灰存性酒調鴨

毛搽上其毒即收一時即愈。

一婦人交腸病者糞從小便出尿從大便出濕瀉不分必是夏月伏暑

而致須用五苓散加牛膝海金沙木通通草但令大小便各歸本道即

安西園公治臨賴徐少川母服此藥而愈加車前子。

一治婦人姪亂思色久之必有貓鬼相侵情通似睡不醒交媾昏

迷淫精滑漏陰而不談日見容色衰瘵用

鹿角屑搗細末以水調方寸土服之即愈也。

○一治女人陰中生瘡如蟲咬痛用

桃葉搗爛綿裹納陰中三四易即瘥。

茄病

○一治女人生閉上茄病取茄蒂剉煎水洗若另出者用巴豆將絲線

二人索佳用巴豆搗之用絲線纏其毒上過一晚即落搗生門邊縛上

亦用茄蒂煎水洗如在內用枯礬與茄蒂同煎水洗。

○一論婦人茄病原因生產月未滿是因取重物膀胱墜下若見紅茄紫

茄可治白者不治。

人參三錢半白朮錢半扶蘆二錢當歸三錢 川芎二錢 白芍火煨三錢

懷熟地黃二錢半 陳皮去白三 枳殼麩炒一錢半

沉香二錢 肉桂二錢 吳茱萸湯泡二錢

甘草炙五分

右劉二劑除沉香磨水生薑一片水煎空心服。

再服白微散

白微二錢 當歸三錢 川芎三錢 懷熟地黃三錢

白芍錢半 蒼朮米泔浸 牡丹皮一錢 澤蘭二十片

靈骨花即紫葳花三錢

右劉二劑濯園葉每劑十片水煎空心服後薰洗之藥其物自上洗藥

宜黃連五錢 金毛狗脊八錢 水楊柳根一兩

五倍子八錢 魚腥草一兩 枯礬七錢

右為散每帖用如數大罐貯藥煎滾放桶內去罐上紙蓋其藥水溫傾小半在盆內洗次日再將前藥煎滾薰如前洗其物自收次服三朱九斷根

吳茱萸 水泡七次

家茱萸 陳者佳 溫水洗去塵垢

山茱萸 去核各一兩

白茯苓 炒去刺八錢

小茴香 七錢 炒入鹽少許 海藻 八錢 洗去鹽

玄胡索 七錢半

牙枯梗 八錢半

白茯苓 七錢半

川練子 去核一兩半

五味子 七錢半

花青皮 去穢七錢半

右十二味俱要足秤不可短少為極細末用真正頭酒調早米粉打糊為丸如梧桐子大空心白湯淡酒任下